

PRAVILNIK**O UPOTREBI BOJA U HRANI****DIO PRVI - OPĆE ODREDBE****Član 1.****(Predmet)**

Pravilnikom o upotrebi boja u hrani (u dalnjem tekstu: Pravilnik) regulira se upotreba boja kao kategorije prehrambenih aditiva u raznim vrstama hrane, propisuju specifični kriteriji čistoće, kao i drugi zahtjevi koje boje moraju ispuniti u proizvodnji i prometu.

Član 2.**(Definicija)**

- (1) U smislu ovog Pravilnika, boje su supstance koje daju ili obnavljaju boju hrane, a uključuju prirodne sastojke hrane ili prirodne izvore koji se uobičajeno, kao takvi, ne konzumiraju kao hrana i ne upotrebljavaju kao karakteristični sastojci hrane ili namirnice.
- (2) U smislu ovog Pravilnika, boje su preparati iz hrane i drugih prirodno izvornih materijala, koji su dobiveni fizičkom i/ili hemijskom ekstrakcijom koja dovodi do selektivnog izdvajanja pigmenata u vezi sa nutritivnim ili aromatskim sastojcima.

Član 3.**(Izuzeci od primjene)**

U skladu sa ovim Pravilnikom, bojama se ne smatraju sljedeće supstance:

- a) hrana, suha ili koncentrirana, i arome koje se dodaju u toku proizvodnje složene hrane, s ciljem poboljšanja njene arume, okusa ili nutritivnih svojstava i sekundarnog učinka bojenja hrane, kao što su paprika, kurkuma i šafran,
- b) boje koje se upotrebljavaju za bojenje nejestivih vanjskih dijelova hrane, kao što su površinska zaštita za sir ili omotači za kobasice.

Član 4.**(Zabranjeno dodavanje boja u hrani)**

- (1) Ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom, zabranjeno je dodavanje boja hrani navedenoj u Aneksu II.
- (2) U skladu sa ovim Pravilnikom, "nepreradena" hrana iz Aneksa II je hrana koja nije podvrgnuta obradi koja dovodi do bitne promjene njenog prvobitnog stanja (pri čemu ona može biti: izdijeljena, servirana, odkoštana, samijevena, oljuštena, očišćena, isječena, usitnjena, duboko zamrznuta, zamrznuta, rashladena, upakovana, raspakovana i sl.).

Član 5.**(Liste odobrenih boja u hrani)**

- (1) Samo se supstance navedene u Aneksu I mogu upotrebljavati kao boje u hrani.
- (2) Boje se mogu upotrebljavati samo u hrani navedenoj u aneksima III, IV i V pod uslovima koji su propisani u tim aneksima.
- (3) Boje se mogu upotrebljavati u hrani iz stava (2) ovog člana kada je ona namijenjena za posebne prehrambene potrebe u skladu sa odgovarajućim propisima.
- (4) Boje se ne mogu upotrebljavati u hrani iz Aneksa II, osim ako je to posebno propisano aneksima III, IV i V.
- (5) Boje koje su dozvoljene samo za određenu upotrebu propisane su Aneksom IV.

- (6) Boje koje su općenito dozvoljene u hrani i uslovi za njihovu upotrebu propisani su Aneksom V.
- (7) Aneksi I, II, III, IV i V sastavni su dio ovog Pravilnika.

Član 6.

(Maksimalna količina dozvoljenih boja u hrani)

- (1) Maksimalna količina dozvoljenih boja u hrani iz aneksa III, IV i V odnosi se na gotova jela pripremljena prema uputstvu za upotrebu, te na količinu osnovne bojene materije iz preparata boje.
- (2) Pojam "quantum satis" iz aneksa ovog Pravilnika znači da maksimalno dozvoljena količina nije određena. Materije za bojenje upotrebljavat će se u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom u količini koja nije veća od potrebne da bi se postigao željeni cilj i pod uslovom da su ispunjeni specifični kriteriji čistoće.

Član 7.

(Zabranjene direktnе prodaje boja)

Zabranjeno je direktno prodavati potrošačima sljedeće odobrenе boje iz Aneksa I:

- a) E -123 amarant,
- b) E -127 eritrozin,
- c) E -154 braon FK,
- d) E -160b anato, biksin, norbiksin,
- e) E- 161g kantaksantin,
- f) E - 173 aluminij,
- g) E -180 litolrubin BK.

Član 8.

(Obilježavanje mesa i jaja)

- (1) Za obilježavanje mesa i organa zakalnih životinja, nakon obavljenog veterinarsko-zdravstvenog pregleda, kao i za druga obilježavanja propisana drugim propisima za meso i mesne proizvode, mogu se koristiti sljedeće boje iz Aneksa I:
- a) E 155 smeđa HT,
 - b) E 133 brilijant plava FCF,
 - c) E 129 alura crvena AC,
 - d) Mješavine boja E 133 brilijant plava FCF i E 129 alura crvena AC.
- (2) Samo boje iz Aneksa I mogu se upotrebljavati za dekorativno farbanje ljski jaja ili za stavljanje žiga na ljske jaja u skladu s odgovarajućim propisima o uslovima za prodaju jaja.

Član 9.

(Aluminijski pigmenti boja)

- (1) Za bojenje hrane mogu se koristiti i aluminijski pigmenti boja, boje s odobrene liste aditiva iz Aneksa I.
- (2) Aluminijski pigmenti boja su proizvodi nerastvorljivi u vodi, dobiveni reakcijom boja i aluminij (III) - oksida u vodenoj sredini.
- (3) Sadržaj boje u aluminijskim pigmentima boja mora odgovarati sadržaju u proizvođačkoj specifikaciji.

- (4) Aluminijski pigmenti boja za hranu moraju zadovoljavati posebne uslove kvaliteta, odnosno specifičnih kriterija čistoće za odobrene boje za upotrebu u hrani.

DIO DRUGI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

(Usklađenost)

- (1) Samo boje koje su usklađene sa zahtjevima ovog Pravilnika i Pravilnika o uslovima upotrebe prehrambenih aditiva u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi mogu se staviti u promet na tržištu u Bosni i Hercegovini.
- (2) Sve boje koje se nalaze na zalihama a koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom mogu se utrošiti do isteka zaliha, a najkasnije šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
- (3) Dozvoljena je prodaja hrane koja se u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika nalazi na tržištu dok joj ne istekne rok upotrebe, kao i hrane koja potiče iz uvoza, a za koju je pokrenut postupak uvoza prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 11.

(Obaveze Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine)

- (1) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dužna je uspostaviti sistem ispitivanja potrošnje odobrenih boja, a dobivene informacije bit će upotrijebljene za ocjenu i praćenje mogućeg rizika upotrebe tih boja, kako bi se u slučaju štetnog djelovanja odlučilo da li je potrebno izvršiti bilo kakve izmjene u zakonodavstvu.
- (2) Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je obavezna provoditi kampanju u svrhu podizanja svijesti javnosti, kako bi javnost bila informisana o dozvoljenim bojama i sistemu E-brojeva.

Član 12.

(Službene kontrole i inspekcijski nadzor)

Službene kontrole i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika provodit će se na način određen važećim zakonskim propisima.

Član 13.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe Pravilnika o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode ("Službeni list SFRJ", broj. 39/89), koje se odnose na upotrebu boja u hrani.

Član 14.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 164/08
8. maja 2008. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
dr. Nikola Špirić, s. r.

ANEKS I

LISTA BOJA ČIJA JE UPOTREBA DOZVOLJENA U HRANI

Napomena: Dozvoljena je upotreba aluminijskih pigmenata boja dobivenih iz boja koje se spominju u ovom aneksu.

E No	Uobičajeni naziv	Indeksni br ⁽¹⁾ boje ili opis
E 100	Kurkumin	75300
E 101	(i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5'-fosfat	Žuti do žuto-narandžasti kristalni prah, sa blagim mirisom i gorkim okusom za (ii) Riboflavin-5'-fosfat
E 102	Tartrazin	19140
E 104	Kvinolin žuta	47005
E 110	Zalazak sunca žuta FCF Narandžasto žuta S	15985
E 120	Kokineal, Karminska kiselina, Karmini	75470
E 122	Azorubin, Karmoizin	14720
E 123	Amarant	16185
E 124	Ponceau 4R, Kokineal crvena A	16255
E 127	Eritrozin	45430
E 129	Alura crvena AC	16035
E 131	Patent plava V	42051
E 132	Indigotin, Indigo karmin	73015
E 133	Brilijantno plava FCF	42090
E 140	Hlorofili i Hlorofilini: (i) Hlorofili (ii) Hlorofilini	75810 75815
E 141	Bakreni kompleksi hlorofila i hlorofilina (i) Bakreni kompleksi hlorofila (ii) Bakreni kompleksi hlorofilina	75815
E 142	Zelena S	44090
E 150a	Obična karamela (2)	Tamno smeđa do crna tečnost ili čvrsta materija
E 150b	Kaustična sulfit karamela	Tamno smeđa do crna tečnost ili čvrsta materija
E 150c	Amonijačna karamela	Tamno smeđa do crne tečnosti ili čvrsta materija
E 150d	Sulfit amonijačna karamela	Tamno smeđa do crne tečnosti ili čvrsta materija
E 151	Brilijantno crna BN, Crna PN	28440
E 153	Biljni ugalj	Crni prah, bez okusa i bez mirisa
E 154	Smeđa FK	Crveno-smeđi prah ili granule
E 155	Smeđa HT	20285
E 160a	Karoteni: (i) Miješani karoteni (ii) Beta-karoten	75130 40800
E 160b	Anato, Biksin, Norbiksin	75120
E 160c	Ekstrakt paprike, Kapsantin, Kapsorubin	Tamno crvena viskozna tečnost
E 160d	Likopen	Tamno crvena viskozna tečnost
E 160e	Beta-apo-8'-karotenal (C 30)	40820
E 160f	Etil ester beta-apo-8'-karotenska kiselina (C 30)	40825
E 161b	Lutein	Tamna, žuto-smeđa tečnost
E 161g	Kantaksantin	Tamno ljubičasti kristali ili kristalni prah
E 162	Cvekla crvena, Betanin	Crvena ili tamno crvena tečnost, kaša, prah ili čvrsta materija
E 163	Antocijanini	Pripremljeni fizičkim putem iz voća i povrća
E 170	Kalcij karbonat	77220
E 171	Titanij dioksid	77891
E 172	Željezo oksidi i hidroksidi	77491 77492 77499
E 173	Aluminij	Srebreno-sivi prah ili mali listići

E 174	Srebro	Prah ili mali lističi srebrene boje
E 175	Zlato	Prah ili mali lističi zlatne boje
E 180	Litolrubin BK	Crveni prah

- (1) Indeksni brojevi boja uzeti su iz trećeg izdanja od 1982 Indeksa boja, tomovi 1 do 7, 1315. Također iz amandmana 37 do 40 (125), 41 do 44 (127-50), 45 do 48 (130), 49 do 52 (132-50), 53 do 56 (135).
- (2) Termin karamela odnosi se na proizvode manje ili više intenzivno smeđe boje koji su namijenjeni za bojenje. Ne odnosi se na šećerni aromatski proizvod dobiven zagrijavanjem šećera koji se koristi za davanje arome hrani (npr. slatkiša, peciva, alkoholnih pića).

ANEKS II**HRANA KOJA NE SMIJE DA SADRŽI DODANE BOJE, OSIM GDJE JE TO POSEBNO PREDVIĐENO ANEKSIMA III, IV ILI V OVOG PRAVILNIKA**

(Navodi koji se koriste u ovom aneksu ne utiču na princip „prenosa“ u slučajevima gdje proizvodi sadrže sastojke sa sopstvenim legitimnim bojama.)

1. Neprerađena hrana
2. Sve flaširane ili pakovane vode
3. Mlijeko, poluobrano ili obrano mlijeko, pasterizirano ili sterilizirano (uključujući UHT sterilizaciju) (nearomatizirano)
4. Čokoladno mlijeko
5. Fermentirano mlijeko (nearomatizirano)
6. Prezervirana mlijeka kako je to definirano njihovim posebnim propisima
7. Mlaćenica (nearomatizirana)
8. Vrhanje i vrhnje u prahu (nearomatizirano)
9. Ulja i masti životinjskog ili biljnog porijekla
10. Jaja i proizvodi od jaja kako je to definirano njihovim posebnim propisima
11. Brašno i drugi mlinski proizvodi i škrob
12. Hlijeb i slični proizvodi
13. Tjestenina i njoke
14. Šećer, uključujući sve mono i disaharide
15. Paradajz kaša i konzervirani i flaširani paradajz
16. Sosovi na bazi paradajza
17. Voćni sok i voćni nektar kako je to definirano u njihovim posebnim propisima i sok od povrća
18. Voće, povrće (uključujući krompir) i gljive - konzervirano, flaširano ili sušeno; prerađeno voće, povrće (uključujući krompir) i gljive
19. Ekstra džem, ekstra pekmez, i kesten pire kako je to definirano u njihovim posebnim propisima; creme de pruneaux
20. Riba, mekušci i ljuskari, meso, piletina i divljač kao i njihove priprave, ali ne uključuje pripremljena jela koja sadrže ove sastojke
21. Proizvodi od kakaa i čokoladne komponente u proizvodima od čokolade kako je definirano njihovim posebnim propisima
22. Pržena kava, čaj, cikorija; ekstrakti čaja i cikorija; priprave od čaja, biljaka, voća i žitarica za čajeve, kao i mješavine i instant mješavine ovih proizvoda
23. So, zamjene za so, začini i mješavine začina
24. Vino i drugi proizvodi kako je to definirano njihovim posebnim propisima
25. Korn, Kornbrand, žestoka pića od voća, Ouzo, Grappa, Tsikoudia sa Krita, Tsipouro iz Makedonije, Tsipouro iz Soluna, Tsipouro iz Tiranovosa, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin, kako je to definirano posebnim propisima o žestokim pićima

26. Sambuca, Maraschino i Mistra kako je to definirano posebnim propisima o žestokim pićima
27. Sangria, Clarea i Zurra kako je to navedeno u posebnim propisima o aromatiziranim vinima, aromatiziranim proizvodima na bazi vina aromatiziranim koktelima od proizvoda vina
28. Vinsko sirće
29. Hrana za dojenčad i malu djecu kako je to navedeno u posebnim propisima uključujući hranu za dojenčad i malu djecu koja nisu dobrog zdravlja
30. Med.
31. Slad i proizvodi od slada
32. Sazreli i nesazreli sir (nearomatizirani)
33. Puter od ovčjeg i kozjeg mlijeka

ANEKS III

HRANA KOJOJ SE MOGU DODATI SAMO ODREĐENE DOZVOLJENE BOJE

Hrana	Dozvoljene boje	Maksimalni nivo
Ječmeni hlijeb	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Pivo "Cidre bouché"	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Puter (uključujući puter reducirane masnoće i koncentrovani puter)	E 160a Karoteni	<i>quantum satis</i>
Margarin, ostale emulzije masnoće, i masnoće koje gotovo i ne sadrže vodu	E 160a Karoteni E 100 Kurkumin E 160b Anato, Biksin, Norbiksin	<i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> 10 mg/kg
"Sage Derby" sir	E 140 Hlorofili Hlorofilini E 141 Bakreni kompleksi hlorofila hlorofilina	<i>quantum satis</i>
Sazreli narandžasti, žuti i raspukli bijeli sir; nearomatizirani prerađeni sir	E 160a Karoteni E 160c Ekstrakt paprike E 160b Anato, Biksin, Norbiksin	<i>quantum satis</i> 15 mg/kg
"Red Leicester" sir	E 160b Anato, Biksin, Norbiksin	50 mg/kg
"Mimolette" sir	E 160b Anato, Biksin, Norbiksin	35 mg/kg
"Morbier" sir	E 153 Povrtni ugalj	<i>quantum satis</i>
Crveni mramorni sir	E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 163 Antocijanini	125 mg/kg <i>quantum satis</i>
Sirče	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Viski, žestoka pića od žita (osim Korn ili Kombrand ili Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise), Žestoko vino, rum, brendi, Weinbrand, grape marc, grape marc spirit (osim Tsikoudia i Tsiptouro i Eau de vie de marc Marque nation ale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira velha kako je to navedeno u posebnim propisima o žestokim pićima	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Aromatizirana pića na bazi vina (osim bitter sode) i aromatizirana vina kako je to navedeno u posebnim propisima	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Americano	E 150a Obična karamela E 150b Kauštična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela E 163 Antocijanini	<i>quantum satis</i>

	E 100 Kurkumin E 101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5' -fosfat E 102 Tartrazin E 104 Kvinolin žuta E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 122 Azorubin karmoisin E 123 Amarant E 124 Ponceau 4R	100 mg/l (pojedinačno ili u kombinaciji)
Bitter soda, bitter vino kako je to navedeno u posebnim propisima o aromatiziranim vinima, aromatiziranim pićima na bazi vina i aromatiziranim koktelima od proizvoda vina	E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela E 100 Kurkumin E 101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5' -fosfat E 102 Tartrazin E 104 Kvinolin žuta E 110 Zalazak sunca žuta FCF Narandžasto žuta S E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 122 Azorubin, Karmoisin E 123 Amarant E 124 Ponceau 4R, Kokineal crvena A E 129 Alura crvena AC	<i>quantum satis</i>
Liker vina i kvalitetna liker vina proizvedena u specifičnim regionima	E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	<i>quantum satis</i>
Povrće u sirćetu, slanoj vodi ili ulju (osim masline)	E 101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5' -fosfat E 140 Hlorofil, Hlorofilini E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela E 141 Bakreni kompleksi hlorofila i hlorofilina E 160a Karoteni: (i) Miješani karoteni (ii) Beta-karoten E 162 Cvekla crvena, betanin E 163 Antocijanini	<i>quantum satis</i>
Istisnute, napuhane i/ili voćem aromatizirane žitarice za doručak	E 150c Amonijačna karamela E 160a Karoteni E 160b Anato, Biksin, Norbiksin E 160c Ekstrakt paprike, Kapsantin, Kapsorubin	<i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> 25 mg/kg <i>quantum satis</i>
Žitarice za doručak sa aromatom voća	E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 162 Cvekla crvena, betanin E 163 Antocijanini	200 mg/kg (pojedinačno ili u kombinaciji)
Džem, pekmez i marmelade kako je to navedeno u odgovarajućim propisima i druge slične priprave od voća uključujući niskokalorične proizvode	E 100 Kurkumin E 140 Hlorofil, Hlorofilini E 141 Bakreni kompleksi hlorofila i hlorofilina E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela E 160a Karoteni: (i) Miješani karoteni (ii) Beta-karoten E 160c Ekstrakt paprike, Kapsantin, Kapsorubin E 162 Cvekla crvena, betanin E 163 Antocijanini	<i>quantum satis</i>

	E 104 Kvinolin žuta E 110 Zalazak sunca žuta E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 124 Ponceau 4R, Kokineal crvena A E 142 Zelena S E 160d Lipkopen E 161b Lutein	100 mg/kg (pojedinačno ili u kombinaciji)
Kobasice, paštete	E 100 Kurkumin E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Amonijačna karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela E 160a Karoteni E 160c Ekstrakt paprike, Kapsantin, Kapsorubin E 162 Cvekla crvena, betanin E 129 Alura Red	20 mg/kg 100 mg/kg <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> 20 mg/kg 10 mg/kg <i>quantum satis</i> 25 mg/kg
Meso za sendviče	E 129 Alura Red AC	25 mg/kg
Kobasice za doručak sa minimalnim sadržajem žitarica od 6%	E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 150a Obična karamela E 150b Kaustična sulfit karamela E 150c Kaustična sulfit karamela E 150d Sulfit amonijačna karamela	100 mg/kg <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i> <i>quantum satis</i>
Meso za pljeskavice sa minimalnim sadržajem povrća i/ili žitarica od 4%	E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini E 124 Ponceau 4R, Kokineal crvena A	200 mg/kg 250 mg/kg
"Chorizo" kobasice "Salchichon"	E 110 Zalazak sunca žuta FCF E 124 Ponceau 4R, Kokineal crvena A	135 mg/kg 200 mg/kg
"Sobrasada"	E 100 Kurkumin E 101 (i) Riboflavin (ii) Riboflavin-5'-fosfat E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini	<i>quantum satis</i>
Pasturme (jestivi vanjski omotač)	E 100 Kurkumin	<i>quantum satis</i>
Sušene granule i listići od krompira	E 102 Tartrazin	100 mg/kg
Prerađeni grječeni i baštenški grašak (konzervisani)	E 133 Brilijantno plava E 142 Zelena S	20 mg/kg 10 mg/kg

ANEKS IV**BOJE DOZVOLJENE SAMO ZA POSEBNU UPOTREBU**

Boja	Hrana	Maksimalni nivo
E 123 Amarant	Aperitiv vina, žestoka pića uključujući proizvode sa manje od 15 vol. % alkohola po zapremini	30 mg/l
	Riblja ikra	30 mg/kg
E 127 Eritrozin	Višnje za koktele i kandirane višnje	200 mg/kg
	"Bigarreaux" višnje u sirupu i u koktelima	150 mg/kg
E 154 Smeda FK	"Kippers"	20 mg/kg
E 161g Kantaksantin	"Saucisses de Strasbourg"	15 mg/kg
E 173 Aluminij	Vanjske obloge slatkisa od šećera za dekoraciju kolača i peciva	<i>quantum satis</i>
E 174 Srebro	Vanjske obloge na konditorskim proizvodima Dekoracije za čokoladu Likeri	<i>quantum satis</i>
E 175 Zlato	Vanjske obloge na konditorskim proizvodima Dekoracije za čokoladu Likeri	<i>quantum satis</i>
E 180 Litolrubin BK	Jestiva kora od sira	<i>quantum satis</i>
E 160b Anato, Biksin, Norbiksin	Margarin, minarin, ostale masne emulzije, i masti praktično bez sadržaja vode	10 mg/kg
	Dekoracije i omotači	20 mg/kg
	Fini pekarski proizvodi	10 mg/kg
	Jestivi ledeni proizvodi	20 mg/kg
	Likeri, uključujući ojačane napitke sa manje od 15% alkohola po zapremini	10 mg/l
	Aromatizirani i topljeni sir	15 mg/kg
	Sazreli narandžasti, žuti i raspukli bijeli sir Nearomatizirani topljeni sir	15 mg/kg
	Deserti	10 mg/kg
	'Grickalice': suhi, slani proizvodi od krompira, žitarica ili na bazi škroba:	
	- Istisnuti ili napuhani slani proizvodi za grickanje	20 mg/kg
	- Ostali slani proizvodi za grickanje i jezgrčasto voće sa slanim preljevima	10 mg/kg
	Dimljena riba	10 mg/kg
	Jestiva kora od sira i jestivi omotači	20 mg/kg
	"Red Leicester" sir	50 mg/kg
	"Mimolette" sir	35 mg/kg
	Istisnute, napuhane i/ili voćem aromatizirane žitarice za doručak	25 mg/kg

ANEKS V**BOJE ČIJA JE UPOTREBA DOZVOLJENA U HRANI OSIM ONIH KOJE SU NAVEDENE U ANEKSIMA II I III****DIO PRVI**

Sljedeće boje mogu se upotrebljavati prema principu *quantum satis* u hrani koja se spominje u aneksu V dio 2 i u svoj ostaloj hrani osim onih koje su navedene u aneksima II i III.

- E 101 (i) Riboflavin
 (ii) Riboflavin-5'-fosfat
- E 140 Hlorofil i hlorofilini
- E 141 Bakreni kompleksi hlorofila i hlorofilina
- E 150a Obična karamela
- E 150b Kaustična sulfit karamela
- E 150c Amonijačna karamela
- E 150d Sulfit amonijačna karamela
- E 153 Biljni ugalj
- E 160a Karoteni
- E 160c Ekstrakt paprike, Kapsantin, Kapsorubin
- E 162 Cvekla crvena, Betanin
- E 163 Antocijanini
- E 170 Kalcij karbonat
- E 171 Titan dioksid
- E 172 Željezo oksidi i hidroksidi

DIO DRUGI

Sljedeće boje mogu se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji u sljedećoj hrani do maksimalno navedenih količina koje se navode u tabeli. Međutim, za bezalkoholna aromatizirana pića, jestive ledene proizvode, deserte, fine pekarske proizvode i slatkiše, boje se mogu upotrebljavati do nivoa koji je naveden u odgovarajućoj tabeli ali količina svake od boja E 110, E 122, E 124 i E 155 ne smije prelaziti 50 mg/kg ili 50 mg/l.

- E 100 Kurkumin
- E 102 Tartrazin
- E 104 Kvinolin žuta
- E 110 Zalazak sunca žuta FCF
- E 120 Kokineal, Karminska kiselina, Karmini
- E 122 Azorubin, Karmoizin
- E 124 Ponceau 4R, Kokineal crvena A
- E 129 Alura crvena AC
- E 131 Patent plava V
- E 132 Indigotin, Indigo kamin
- E 133 Brilijantno plava FCF
- E 142 Zelena S
- E 151 Brilijantno cma BN, Crna PN
- E 155 Smeđa HT
- E 160d Likopen
- E 160e Beta-apo-8'-karotenal (C 30)
- E 160f Etil ester Beta-apo-8'-karotenske kiseline (C 30)
- E 161b Lutein

Hrana	Maksimalni nivo
Bezalkoholna aromatizirana pića	100 mg/l
Kandirano voće i povrće, Mostarda di frutta	200 mg/kg
Slatko od crvenog voća	200 mg/kg
Slatkiši	300 mg/kg
Dekoracije i omotači	500 mg/kg
Fini pekarski proizvodi (e.g. bečka peciva, biskviti, kolaci i vafli)	200 mg/kg
Jestivi ledeni proizvodi	150 mg/kg
Aromatizirani prerađeni sir	100 mg/kg
Deserti uključujući aromatizirane mlječne proizvode	150 mg/kg
Sosovi, začini (na primjer, kari prah, tandori), kiselina, začinjene kaše, chutney i piccalilli	500 mg/kg
Senf	300 mg/kg
Riblja pašteta i pašteta od ljudskara	100 mg/kg
Unaprijed skuhani ljudskari	250 mg/kg
Zamjena za losos	500 mg/kg
Surimi	500 mg/kg
Riblja ikra	300 mg/kg
Dimljena riba	100 mg/kg
'Grickalice': suhi, slani proizvodi od krompira, žitarica ili na bazi škroba: - Istisnuti ili napuhani slani proizvodi za grickanje - Ostali slani proizvodi za grickanje i jezgričasto voće sa slanim prelevima	200 mg/kg 100 mg/kg
Jestiva kora od sira i jestivi omotači	quartum satis
Kompletne formule za kontrolu težine namijenjene da zamijene ukupni dnevni unos hrane ili pojedinačni obrok	50 mg/kg
Kompletne formule i dodaci prehrani za upotrebu pod liječničkim nadzorom	50 mg/kg
Tečni dodaci hrani/dijetetski integratori	100 mg/l
Čvrsti dodaci hrani/dijetetski integratori	300 mg/kg
Supe	50 mg/kg
Zamjena za meso i ribu na bazi biljnih proteina	100 mg/kg
Alkoholna pića (uključujući proizvode sa manje od 15% alkohola po zapremini), izuzev onih koji se spominju u aneksu II ili III	200 mg/l
Aromatizirana vina, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli od proizvoda vina kako je to navedeno u posebnim propisima, izuzev onih koji se spominju u aneksu II ili III	200 mg/l
Voćna vina (obična ili pjenušava)	
Fermentirani sok od jabuke (osim cidre bouche) i kruške	200 mg/l
Aromatizirana voćna vina, jabuke i kruške	

**SPECIFIČNI KRITERIJI ČISTOĆE
KOJI SE ODNOSE NA ODOBRENE BOJE ZA UPOTREBU U HRANI**

DIO PRVI

Opće specifikacije za aluminijiske pigmente boja

Definicija:	Aluminijski pigmenti boja se pripremaju reakcijom boja koje odgovaraju kriterijima čistoće, su nevedene u odgovarajućoj specifikaciji sa aluminijum-oksidom u vodenom rastvoru. Aluminijum-oksid je obično svježe pripremljena, neosušena materija nastala reakcijom aluminijum-sulfata ili hlorida sa natrijevim ili kalcijevim-karbonatom ili bikarbonatom ili tečnim amonijakom. Nakon što se formiraju lakovi nastali proizvod se filtrira, ispere sa vodom i osuši. Aluminijev oksid koji nije odreagovao može biti prisutan u finalnom proizvodu.
Materija nerastvorljiva u HCl	Najviše do 0.5 %
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2 %(pri neutralnim uslovima) Specifični kriteriji čistoće primjenjuju se na odgovarajuće boje.

DIO DRUGI

SPECIFIČNI KRITRIJI ČISTOĆE

E 100 KURKUMIN	
Sinonimi	CI Prirodna žuta 3, Turmerik žuta, Diferoil metan
Definicija	Kurkumin se dobija ekstrakcijom rastvaračem iz turmerica tj. mljevenih rizoma prirodnih loza <i>Curcuma longa</i> L. Da bi se dobio koncentrovani kurkumin prah, ekstrakt se prečišćava kristalizacijom. Proizvod se uglavnom sastoji od kurkumina; tj. osnovne boje (1,7-bis(4-hidroksi-3-metoksifenil) hepta-1,6-dien-3,5-dion) i njegova dva dezmetoksi derivata u varirajućim proporcijama. Mogu biti prisutne i neznatne količine ulja i smola koji se prirodna javljaju u tumeriku. Za ekstrakciju se mogu koristiti samo sljedeći rastvarači: etil acetat, aceton, ugljen dioksid, dihilometan, n-butanol, metanol, etanol, heksan.
Klasa	Dicinamoilmetan
Br. u Indeksu boja	75300
Einecs	207-280-5
Hemski naziv	I 1,7-Bis(4-hidroksi-3-metoksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion II 1-(4-Hidroksifenil)-7-(4-hidroksi-3-metoksi-fenil-)hepta-1,6-dien-3,5-dion III 1,7-Bis(4-hidroksifenil)hepta-1,6-dien-3,5-dion
Hemski formula	I C ₂₁ H ₂₀ O ₆ II C ₂₀ H ₁₈ O ₅ III C ₁₉ H ₁₆ O ₄
Molekularna masa	I. 368.39 II. 338.39 III. 308.39
Analiza	Sadržaj od najmanje 90% ukupne materije boje E ^{1%} _{1cm} 1 607 na oko 426 nm u etanolu
Opis	Žuto-naranđasti kristalni prah
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u etanolu na oko 426 nm

B. Interval topljenja	179 °C —182 °C
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Etil acetat, aceton, n-butanol, metanol, etanol, heksan - Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 101 (i) RIBOFLAVIN	
Sinonimi	Laktoflavin
Klasa	Isoaloksazin
Einecs	201-507-1
Hemski naziv	7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5 tetrahidroksipentil)-benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion 7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitol) isoaloksazin
Hemjska formula	C ₁₇ H ₂₀ N ₄ O ₆
Molekularna masa	376.37
Analiza	Sadržaj najmanje 98% na anhidriranoj bazi E _{1cm} ^{1%} 328 na oko 444 nm u vodenom rastvoru
Opis	Žuti do žuto-narandžasti kristalni prah, sa blagim mirisom
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Odnos A ₃₇₅ / A ₂₆₇ je između 0.31 i 0.33 Odnos A ₄₄₄ / A ₂₆₇ je između 0.36 i 0.39 (u vodenom rastvoru) Maksimum u vodi na oko 375 nm
B. Specifična rotacija	[α] _D ²⁵ između -115 ° i -140 ° u 0.05 N rastvoru natrij hidroksida
Čistoća	
Gubitak pri sušenju	Najviše do 1.5% nakon sušenja na 105 °C u periodu od 4h
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.1%
Primarni aromatski amini	Najviše do 100 mg/kg (izračunato kao anilin)
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5' – FOSFAT	
Sinonimi	Riboflavin-5'-fosfat natrij
Definicija	Ove specifikacije se primjenjuju na riboflavin 5'-fosfat zajedno sa neznatnim količinama slobodnog riboflavina i riboflavin difosfata
Klasa	Isoaloksazin
Einecs	204-988-6

Hemski naziv	Mononatrij (2R,3R,4S)-5-(3')10-dihidro-'7,8'-dimetil-2',4' -diokso-10'-benzo[y]pteridinil)-2,3,4trihidroksipentil fosfat; mononatrijeva so 5'-monofosfat estera riboflavina
Hemski formula	Za dihidratni oblik: C ₁₇ H ₂₀ N ₄ NaO ₉ P·2H ₂ O Za anhidridni oblik: C ₁₇ H ₂₀ N ₄ NaO ₉ P
Molekularna masa	541.36
Analiza	Sadržaj najmanje 95% ukupne materije boje izračunato kao C ₁₇ H ₂₀ N ₄ NaO ₉ P·2H ₂ O E ^{1%} _{1cm} 250 na oko 375 nm u vodenom rastvoru
Opis	Žuti do narandžasti kristalni higroskopni prah, sa blagim mirisom i gorkog okusa
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Odnos A ₃₇₅ / A ₂₆₇ je između 0.30 i 0.34 Odnos A ₄₄₄ / A ₂₆₇ je između 0.35 i 0.40 (u vodenom rastvoru) Maksimum u vodi na oko 375 nm
B. Specifična rotacija	[α] ²⁰ _D između +38 ° i +42 ° u 5 molarnom rastvoru HCl
Čistoća	
Gubitak pri sušenju	Najviše do 8% (100 °C, 5 h u vakumu nad P ₂ O ₅) za dihidratni oblik
Sulfatni pepeo	Najviše do 25%
Anorganski fosfat	Najviše do 1.0% (izračunato kao PO ₄ na anhidriranoj bazi)
Subsidiarne materije boje	Riboflavin (slobodni): Najviše do 6% Riboflavin difosfat: Najviše do 6%
Primarni aromatski amini	Najviše do 70 mg/kg (izračunato kao anilin)
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 102 TARTRAZIN	
Sinonimi	CI Žuta za hranu 4
Definicija	Tartrazin se u osnovi sastoji od trinatrij 5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatogenilazo)-H-pirazol-3-karboksilata i subsidiarnih materija boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim komponentama. Tartrazin se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	19140
Einecs	217-699-5
Hemski naziv	Trinatrij-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilazo)-H-pirazol-3-karboksilat
Hemski formula	C ₁₆ H ₉ N ₄ Na ₃ O ₉ S ₂
Molekularna masa	534.37
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so E ^{1%} _{1cm} 530 na oko 426 nm u vodenom rastvoru
Opis	Svetlo narandžasti prah ili granule
Identifikacija	

A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 426 nm
B. Žuti rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 1.0%
Organiski spojevi osim materija boje:	Ukupno najviše do 0.5%
4-hidrazinobenzen sulfonska kiselina	
4-aminobenzen-1-sulfonska kiselina	
5-okso-1-(4-sulfofenil)-2-pirazolin-3-karboksilna kiselina	
4,4 -diamoaminodi (benzen sulfonska kiselina)	
Tetrahidroksisukcinska kiselina	
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 104 KVINOLIN ŽUTA	
Sinonimi	CI Žuta 13 za hranu
Definicija	Kvinolin žuta se dobiva sulfoniziranjem 2-(2-kvinolil)indan-1,3-diona. Kvinolin žuta se u osnovi sastoji od natrijevih soli mješavine disulfonata (prvenstveno), monosulfonata i trisulfonata gore navedenog jedinjenja i od subsidiarnih materija boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Kvinolin žuta se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Kinofталон
Br. u Indeksu boja	47005
Einecs	305-897-5
Hemski naziv	Dinatrijeve soli disulfonata 2-(2-kvinolil)indan-1,3-diona (osnovni sastojak)
Hemski formula	C ₁₈ H ₉ NNa ₂ O ₈ S ₂ (osnovni sastojak)
Molekularna masa	477.38 (osnovni sastojak)
Analiza	Sadržaj najmanje 70% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so Kvinolin žuta mora imati sljedeći sastav: Od ukupne materije boje koja je prisutna: —Najmanje 80% mora biti dinatrij 2-(2-kvinolil)indan-1,3-dion-disulfonata —Najviše do 15% mora biti natrij 2-(2-kvinolil)indan-1,3-dion-monosulfonata —Najviše do 7.0% mora biti trinatrij 2-(2-kvinolil)indan-1,3-dion-trisulfonata E ^{1%} _{1cm} 865 (osnovni sastojak) na oko 411 nm u vodenom rastvoru acetatne kiseline

Opis	Žuti prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodenom rastvoru acetatne kiseline pri pH 5 na oko 411 nm
B. Žuti rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 4.0%
Organska jedinjenja osim materije boje:	Ukupno najviše do 0.5 %
2-metilkvinolin	
2-metilkvinolin-sulfonska kiselina	
Ftalna kiselina	
2,6-dimetil kvinolin	
2,6-dimetil kvinolin sulfonska kiselina	
2-(2-kvinolil)indan-1,3-dion	Najviše do 4 mg/kg
Nesulfonirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 110 ZALAZAK SUNCA ŽUTA FCF	
Sinonimi	CI Žuta 3, Narandžasto žuta S, za hranu
Definicija	Zalak sunca žuta FCF se u osnovi sastoji od dinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonata i subsidiarnih materija boje zajedno sa natrij hiloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Zalak sunca žuta FCF se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	15985
Einecs	220-491-7
Hemski naziv	Dinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonat
Hemski formula	C ₁₆ H ₁₀ N ₂ Na ₂ O ₇ S ₂
Molekularna masa	452.37
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so E ^{1%} _{1cm} 555 na oko 485 nm u vodenom rastvoru pri pH 7
Opis	Narandžasto-crveni prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 485 nm pri pH 7
B. Narandžasti rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 5%

1-(fenilazo)-2-naftalenol (Sudan I)	Najviše 0,5 mg/kg
Organska jedinjenja osim materije boje: 4-aminobenzen-1-sulfonska kiselina 3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina 6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kiselina 4,4' -diamoaminodi(benzen sulfonska kiselina) 6,6'-oksiidi(naftalen-2-sulfonska kiselina)	Ukupno najviše do 0,5%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0,01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0,2 % pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
E 120 KOKINEAL, KARMINSKA KISELINA, KARMINI	
Definicija	Karmin i karminska kiselina se dobivaju iz vodenih, vodeno alkoholnih ili alkoholnih ekstrakata iz Kokineala, koji se sastoji od sušenih tijela ženke insekt <i>Dactylopius coccus</i> Costa. Osnovna boja je karminska kiselina. Mogu se stvoriti aluminjski pigmenti karminske kiseline (karmini) u kojima sesmatra da se aluminijski karminska kiselina nalaze u molarnom omjeru 1:2. U komercijalnim proizvodima osnovna boja nalazi se u prisustvu sa katjonima amonija, kalcija, kalija ili natrija, pojedinačno ili u kombinaciji, a ti katjoni također mogu biti prisutni u višku. Komercijalni proizvodi također mogu sadržavati proteinski materijal čiji je izvor insekt, i također može sadržavati slobodni karminat ili malo rezidue nevezanih kationa aluminijskih.
Klasa	Antrakvinon
Br. u Indeksu boja	75470
Einecs	Kokineal: 215-680-6; Karminska kiselina: 215-023-3; Karmini: 215-724-4
Hemski naziv	7-β-D-glukopiranosil-3,5,6,8-tetrahidroksi-1-metil-9,10-diksoantracen-2-karboksilna kiselina (karminska kiselina); karmin je hidratizirani aluminijev helat te kiselina
Hemski formula	C ₂₂ H ₂₀ O ₁₃ (karminska kiselina)
Molekularna masa	492,39 (karminska kiselina)
Analiza	Sadržaj najmanje 2,0% karminske kiseline u ekstraktima koji sadrže karminsku kiselinu; Najmanje 50% karminske kiseline u helatima.
Opis	Crveni do tamno crveni, prhki prah ili čvrsta materija. Ekstrakt Kokineala je obično tamno crvena tečnost ali se također može osušiti u prah.
Identifikacija	

Spektrometrija	Maksimum u vodenom rastvoru amonijaka na oko 518 nm Maksimum u razblaženom rastvoru hlorovodonične kiseline oko 494 nm za karminsku kiselinu
Čistoća	
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 122 AZORUBIN, KARMOIZIN	
Sinonimi	CI Crvena 3 za hranu
Definicija	Azorubin se u osnovi sastoji od dinatrij 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-1-sulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Azorubin se opisuje kao natrijeva so. Kalcijevi i kalijevi soli su takođe dozvoljene.
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	14720
Einecs	222-657-4
Hemski naziv	Dinatrij 4-hidroksi-3-(4-sulfonato-1-naftilazo) naftalen-1-sulfonat
Hemski formula	C ₂₀ H ₁₂ N ₂ Na ₂ O ₇ S ₂
Molekularna masa	502.44
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so $E^{1\%}_{1cm}$ 510 na oko 516 nm u vodenom rastvoru
Opis	Crveni do bordo prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 516 nm
B. Crveni rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 2.0%
Organska jedinjenja osim materije boje:	Ukupno najviše do 0.5%
4-aminonaptafen-1-sulfonska kiselina	
4-hidroksinaftalen-1-sulfonska kiselina	
Nesulfonizovani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 123 AMARANT	
Sinonimi	CI Crvena 9 za hranu

Definicija	Amarant se u osnovi sastoji od trinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Amarant se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	16185
Einecs	213-022-2
Hemski naziv	Trinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-3,6-disulfonat
Hemski formula	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ Na ₃ O ₁₀ S ₃
Molekularna masa	604,48
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so E ^{1%} _{1cm} 440 na oko 520 nm u vodenom rastvoru
Opis	Crveno-smeđi prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 520 nm
B. Crveni rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 3.0%
Organska jedinjenja osim materije boje: 4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina 3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina 6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kiselina 7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kiselina	Ukupno najviše do 0.5%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 124 PONCEAU 4R, KOKINEAL CRVENA A	
Sinonimi	CI Crvena 7 za hranu, Novi Kokin
Definicija	Ponceau 4R se u osnovi sastoji od trinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Ponceau 4R se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	16255

Einecs	220-036-2
Hemijski naziv	Trinatrij 2-hidroksi-1-(4-sulfonato-1-naftilazo)naftalen-6,8-disulfonat
Hemijiska formula	C ₂₀ H ₁₁ N ₂ Na ₃ O ₁₀ S ₃
Molekularna masa	604.48
Analiza	Sadržaj najmanje 80% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so. E ^{1%} _{1cm} 430 na oko 505 nm u vodenom rastvoru
Opis	Crvenkasti prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 505 nm
B. Crveni rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2 %
Subsidiarne materije boje	Najviše do 1.0 %
Organska jedinjenja osim materije boje: 4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina 7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonska kiselina 3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina 6-hidroksinaftalen-2-sulfonska kiselina 7-hidroksinaftalen-1,3-6-trisulfonska kiselina	Ukupno najviše do 0.5 %
Nesulfonizovani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01 % (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2 % pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 127 ERITROZIN	
Sinonimi	CI Crvena 14 za hranu
Definicija	Eritrozin se u osnovi sastoji od dinatrij 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-okso-6-oksokantan-9-il)benzoat monohidrata i subsidiarne materije boje zajedno sa vodom, natrij hidridom ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Eritrozin se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Ksanten
Br. u Indeksu boja	45430
Einecs	240-474-8
Hemijski naziv	Dinatrij 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-okso-6-oksokantan-9-il)benzoat monohidrat
Hemijiska formula	C ₂₀ H ₁₄ Na ₂ O ₅ ·H ₂ O
Molekularna masa	897.88

Analiza	Sadržaj najmanje 87% ukupne materije boje, izračunato kao anhidirana natrijeva so $E^{1\%}_{1cm} 1100$ na oko 526 nm u vodenom rastvoru pri pH 7
Opis	Crveni prah ili granule.
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 526 nm pri pH 7
B. Crveni rastvor u vodi	
Čistoća	
Anorganski jodidi izračunato kao natrij jodid	Najviše do 0.1%
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje (osim floresceina)	Najviše do 4.0%
Florescein	Najviše do 20 mg/kg
Organska jedinjenja osim materije boje: Tri-jodoresorcinol 2-(2,4-dihidroksi-3,5-diodobenzoil) benzenska kiselina	Najviše do 0.2%
Materija koja se ekstrahuje eterom	Iz rastvora sa pH od 7 do 8, najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
Aluminijski pigmenti	Metoda sa materijom nerastvorljivom u hlorovodoničnoj kiselini nije primjenjiva. Zamjenjuje se materijom nerastvorljivom u natrij hidroksidu, sa najviše do 0.5%, samo za ovu boju
E 129 ALURA CRVENA AC	
Sinonimi	CI Crvena 17 za hranu
Definicija	Alura crvena AC sastoji se u osnovi od dinatrij 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Alura crvena AC se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Monoazo
Br. u Indeksu boja	16035
Einecs	247-368-0
Heminski naziv	Dinatrij 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat
Heminska formula	$C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$
Molekularna masa	496.42
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so $E^{1\%}_{1cm} 540$ na oko 504 nm u vodenom rastvoru pri pH 7
Opis	Tamno crveni prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 504 nm
B. Crveni rastvor u vodi	

Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 3.0%
Organska jedinjenja osim materije boje:	
6-hidroksi-2-naftalene sulfonska kiselina, natrijeva so	Najviše do 0.3%
4-amino-5-metoksi-2-metilbenezen sulfonska kiselina	Najviše do 0.2%
6,6-oksibis (2-naftalen sulfonska kiselina) dinatrijeva so	Najviše do 1.0%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Iz rastvora sa pH 7, najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 131 PATENT PLAVA V	
Sinonimi	CI Plava 5 za hranu
Definicija	Patent plava V sastoji se u osnovi od jedinjenja kalcija ili natrija sa unutarnjom soli [4-(α -(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonij hidroksid i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom ili natrij sulfatom ili kalcij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Kalijeva so je također dozvoljena.
Klasa	Triarilmelan
Br. u Indeksu boja	42051
Einecs	222-573-8
Hemski naziv	Jedinjenje kalcij ili natrija sa unutarnjom soli [4-(α -(4-dietilaminofenil)-5-hidroksi-2,4-disulfofenil-metiliden)2,5-cikloheksadien-1-iliden] dietilamonij hidroksida
Hemjska formula	Jedinjenje kalcija: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Ca_{1/2}$ Jedinjenje natrija: $C_{27}H_{31}N_2O_7S_2Na$
Molekularna masa	Jedinjenje kalcija: 579.72 Jedinjenje natrija: 582.67
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so $E^{\%}_{1cm}$ 2 000 na oko 638 nm u vodenom rastvoru pri pH 5
Opis	Tamno plavi prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na 638 nm pri pH 5
B. Plavi rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 2.0%

Organška jedinjenja osim materije boje: 3-hidroksi benzaldehid 3-hidroksi benzenska kiselina 3-hidroksi-4-sulfobenzenska kiselina N,N-dietilamino benzen sulfonska kiselina	Ukupno najviše do 0.5%
Leuko baza	Najviše do 4.0%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Iz rastvora kod pH 5 najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 132 INDIGOTIN, INDIGO KARMIN	
Sinonimi	CI Plava 1 za hrancu
Definicija	Indigotin se u osnovi sastoji od mješavine dinatrij 3,3'-diokso-2,2'-bi-indoliliden-5,5'-disulfonata, i dinatrij 3,3'-diokso-2,2'-bi-indoliliden-5,7'-disulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Indigotin se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Indigoid
Br. u Indeksu boja	73015
Einecs	212-728-8
Heminski naziv	Dinatrij 3,3'-diokso-2,2'-bi-indoliliden-5,5'-disulfonat
Hemiska formula	C ₁₆ H ₈ N ₂ Na ₂ O ₈ S ₂
Molekularna masa	466.36
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so; dinatrij 3,3'-diokso-2,2'-bi-indoliliden-5,7'-disulfonat: Najviše do 18 % E ^{1%_{1cm}} 480 na oko 610 nm u vodenom rastvoru
Opis	Tamno plavi prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 610 nm
B. Plavi rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Izuzev dinatrij 3,3'-diokso-2,2'-bi-indoliliden-5,7'-disulfonata: Najviše do 1.0%
Organška jedinjenja osim materije boje: Isatin-5-sulfonska kiselina 5-sulfoantranilna kiselina Antranilna kiselina	Ukupno najviše do 0.5%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)

Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 133 BRILIJANT PLAVA FCF	
Sinonimi	CI Plava 2 za hranu
Definicija	<p>Brilijant plava FCF sastoji se u osnovi od dinatrij α-(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino) fenil)-α-(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino) cikloheksa-2,5-dieniliden) toluen-2-sulfonata i njegovih izomera i subsidiarnih materija boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci.</p> <p>Brilijant plava FCF se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.</p>
Klasa	Triarilmelan
Br. u Indeksu boja	42090
Einecs	223-339-8
Hemski naziv	Dinatrij α -(4-(N-etil-3-sulfonatobenzilamino) fenil)- α -(4-N-etil-3-sulfonatobenzilamino) cikloheksa-2,5-dieniliden) toluen-2-sulfonat
Hemski formula	<chem>C37H34N2Na2O9S3</chem>
Molekularna masa	792.84
Analiza	Sadržaj najmanje 85% ukupne materije boje, izračunato kao natrijeva so $E^{1\%}_{1\text{cm}} 1\ 630$ na oko 630 nm u vodenom rastvoru
Opis	Crveno-plavi prah ili granule
Identifikacija:	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 630 nm
B. Plavi rastvor u vodi	
Čistota	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 6.0%
Organska jedinjenja osim materije boje:	
Suma 2-, 3- i 4-formil benzen sulfonskih kiselina	Najviše do 1.5%
3-((etil)(4-sulfofenil) amino) metil benzen sulfonska kiselina	Najviše do 0.3%
Leuko baza	Najviše do 5.0%
Nesulfonizirani primarni aromatski aminii	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri pH 7
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 140 (i) HLOROFILI	

Sinonimi	CI Prirodna zelena 3, Magnezij hlorofil, Magnezij Feofitin
Definicija	Hlorofili se dobivaju ekstrakcijom iz rastvora prirodnih loza jestivog biljnog materijala, trave, luscerke i koprive. Tokom naknadnog odvajanja rastvarača, prirodno prisutni ko-ordinirani magnezij može biti kompletno ili djelimično odvojen od hlorofila dajući odgovarajuće feofitine. Osnovne materije boj su feofitini i magnezij hlorofili. Ekstrahovani produkt, od kojeg je odvojen rastvarač, sadrži i druge pigmente kao što su karotenoidi kao i ulja, masnoće i voskovi koji potiču iz izvornog materijala. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: aceton, metil etil keton, dihlorometan, ugljen dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.
Klasa	Porfirin
Br. u Indeksu boja	75810
Einecs	Hlorofili: 215-800-7, hlorofil a: 207-536-6, hlorofil b: 208-272-4
Hemski naziv	Osnovne materije boje su: Fitil ($^{13}R,17S,18S$)-3-(8-etyl- 13 -metoksikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13'-okso-3-vinil- $^{13}1-13^2-17,18$ -tetrahidrociklopenta[$\alpha\beta$]-porfirin-17-il)propionat, (Feofitin a), ili kao kompleks magnezija (Hlorofil a) Fitil ($^{13}R,17S,18S$)-3-(8-etyl-7-formil- 13 -metoksikarbonil-2,12,18-trimetil-13'-okso-3-vinil- $^{13}1-13^2-17,18$ -tetrahidrociklopenta[$\alpha\beta$]-porfirin-17-il)propionat, (Feofitin b), ili kao kompleks magnezija (Hlorofil b)
Hemski formula	Hlorofil a (kompleks magnezija): $C_{55}H_{72}MgN_4O_5$ Hlorofil a: $C_{55}H_{74}N_4O_5$ Hlorofil b (kompleks magnezija): $C_{55}H_{70}MgN_4O_6$ Hlorofil b: $C_{55}H_{72}N_4O_6$
Molekularna masa	Hlorofil a (kompleks magnezija): 893.51 Hlorofil a: 871.22 Hlorofil b (kompleks magnezija): 907.49 Hlorofil b: 885.20
Analiza	Ukupni sadržaj svih hlorofila i njihovih kompleksa magnezija je najmanje 10% $E^{1\%}_{1cm}$ 700 na oko 409 nm u hloroformu
Opis	Voštana čvrsta materija boje od maslinasto zelene do tamno zelene zavisno od sadržaja ko-ordiniranog magnezija
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u hloroformu na oko 409 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji: Aceton Metil etil keton Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg

E 140 (ii) HLOROFILINI	
Sinonimi	CI Prirodno zelena 5, Natrij Hlorofilin, Kalij Hlorofilin
Definicija	Alkalne soli hlorofilina dobivaju se saponifikacijom ekstrakta iz rastvarača prirodnih loza jestivog biljnog materijala, trave, lucerke i koprive. Saponifikacijom se odstranjuju metil i fitol ester grupe a može doći i do djelimičnog otvaranja ciklopentenil prstena. Kisele grupe se neutraliziraju stvarajući soli kalija i/ili natrija. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: aceton, metil etil keton, dihlorometan, ugljen dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.
Klasa	Porfirin
Br. u Indeksu boja	75815
Einecs	287-483-3
Hemski naziv	Osnovne materije boje u njihovim kiselim oblicima su: — 3-(10-karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il) propionat (hlorofilin a) i — 3-(10-karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il) propionat (hlorofilin b) Zavisno od stepena hidrolize prsten ciklopentenila može biti otvoren što rezultira stvaranjem treće karboksil funkcije. Kompleksi magnezija također mogu biti prisutni.
Hemjska formula	Hlorofilin a (kiseli oblik): C ₃₄ H ₃₄ N ₄ O ₅ Hlorofilin b (kiseli oblik): C ₃₄ H ₃₂ N ₄ O ₆
Molekularna masa	Hlorofilin a: 578.68 Hlorofilin b: 592.66 I jedna i druga može biti uvećana za 18 daltona ako je otvoren ciklopentenilski prsten.
Analiza	Ukupni sadržaj hlorofilina je najmanje 95% uzorka sušenog 1 sat na oko 100 °C. $E_{1cm}^{1\%}$ 700 na oko 405 nm u vodenom rastvoru pri pH 9 $E_{1cm}^{1\%}$ 140 na oko 653 nm u vodenom rastvoru pri pH 9
Opis	Tamno zeleni do plavi/crni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u vodenom fosfatnom baferu/spremniku pri pH 9 na oko 405 nm i na oko 653 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji: Aceton Metil etil keton Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 141 (i) BAKRENI KOMPLEKSI HLOROFILA	
Sinonimi	CI Prirodna zelena 3, Bakar hlorofil, Bakar Feofitin

Definicija	Bakar hlorofili se dobivaju dodavanjem soli bakra supstanci koja se dobije ekstrakcijom iz rastvarača prirodnih boja jestivog biljnog materijala, trave, lucerke, i koprive. Produkt, od kojeg je odstranjen rastvarač, sadrži i druge pigmente kao što su karotenoidi kao i masnoće i voskovi koji potiču iz izvornog materijala. Osnovne materije boje su bakar feofitini. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: aceton, metil etil keton, dihlorometan, ugljen dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.
Klasa	Porfirin
Br. u Indeksu boja	75815
Einecs	Bakar hlorofil a: 239-830-5; Bakar hlorofil b: 246-020-5
Hemski naziv	[Fitil ($13^2R,17S,18S$)-3-(8-etil-13 ² -metoksikarbonil)2,7,12,18-tetrametil-13'-okso-3-vinil-13 ¹ -13 ² -17,18-tetrahidrociklopenta[<i>at</i>]-porfirin-17-il]propionat] bakar (II) (Bakar hlorofil a) [Fitil ($13^2R,17S,18S$)-3-(8-etil-7-formil-132-metoksikarbonil)-2,12,18-trimetil-13'-okso-3-vinil-13 ¹ -13 ² -17,18-tetrahidrociklopenta[<i>at</i>]-porfirin-17-il]propionat] bakar (II) (Bakar hlorofil b)
Hemjska formula	Bakar hlorofil a: $C_{55}H_{72}CuN_4O_5$ Bakar hlorofil b: $C_{55}H_{70}CuN_4O_6$
Molekularna masa	Bakar hlorofil a: 932.75 Bakar hlorofil b: 946.73
Analiza	Ukupni sadržaj bakar hlorofila je najmanje 10%. $E^{1\%}_{1cm}$ 540 na oko 422 nm u hloroformu $E^{1\%}_{1cm}$ 300 na oko 652 nm u hloroformu
Opis	Voštana čvrsta materija boje od plavo zelene do tamno zelene zavisno od sadržaja izvornog materijala.
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u hloroformu na oko 422 nm i na oko 652 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji: Aceton Metil etil keton Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Joni bakra	Najviše do 200 mg/kg
Ukupno bakra	Najviše do 8.0% od ukupnih bakar feofitina
E 141 (ii) BAKARNI KOMLPEKSI HLOROFILINA	
Sinonimi	Natrij bakar hlorofilin, Kalij bakar hlorofilin, CI Prirodno zelena 5

Definicija	Alkalne soli bakar hlorofil se dobivaju dodavanjem bakra produktu dobivenom saponifikacijom ekstrakta iz rastvarača prirodnih loza jestivog biljnog materijala, trave, lucerke i koprive; saponifikacijom se odstranjuju metil i fitol ester grupe a može doći i do djelimičnog otvaranja ciklopentenil prstena. Nakon dodavanja bakra u prečišćene hlorofiline, kisele grupe se neutraliziraju stvarajući soli kalija i/ili natrija. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: aceton, metil etil keton, dihlorometan, ugljen dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.
Klasa	Porfirin
Br. u Indeksu boja	75815
Einecs	
Hemski naziv	Osnovne materije boje u njihovim kiselim oblicima su 3-(10-Karboksilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, kompleks bakra (Bakar hlorofil a) i 3-(10-Karboksilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-okso-2-vinilforbin-7-il)propionat, kompleks bakra (Bakar hlorofil b)
Hemjska formula	Bakar hlorofil a (kiseli oblik): $C_{34}H_{32}CuN_4O_5$ Bakar hlorofil b (kiseli oblik): $C_{34}H_{30}CuN_4O_6$
Molekularna masa	Bakar hlorofil a: 640.20 Bakar hlorofil b: 654.18 I jedna i druga može biti uvećana za 18 daltona ako je otvoren ciklopentenilski prsten.
Analiza	Ukupni sadržaj hlorofilina je najmanje 95% od uzorka sušenog 1 sat na 100 °C. $E^{1\%}_{1cm}$ 565 na oko 405 nm u vodenom fosfatnom buferu pri pH7.5 $E^{1\%}_{1cm}$ 145 na oko 630 nm u vodenom fosfatnom buferu pri pH7.5
Opis	Tamno zeleni do plavo/crni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u vodenom fosfatnom buferu pri pH 7.5 na oko 405 nm i na 630 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Aceton Metil etil keton Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Joni bakra	Najviše do 200 mg/kg
Ukupno bakra	Najviše do 8.0% od ukupnih bakar hlorofilin
E 142 ZELENA S	
Sinonimi	CI Zelena 4 za hrancu, Brilijantno zelena BS

Definicija	Zelena S sastoji se u osnovi od natrij N-[4-(dimetilamino) feni] 2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmelanaminij i subsidijskih materija boja zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Zelena S se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su takođe dozvoljene.
Klasa	Triarilmelan
Br. u Indeksu boja	44090
Einecs	221-409-2
Hemski naziv	Natrij N-[4-[[4-(dimetilamino)fenil](2-hidroksi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilen]2,5-cikloheksadien-1-iliden]-N-metilmelanaminij; Natrij 5-[4-dimetilamino- α -(4-dimetilimino)cikloheksa-2,5-dieniliden]benzil]-6-hidroksi-7-sulfonataftalen-2-sulfonat (alternativni hemski naziv).
Hemjska formula	C ₂₇ H ₂₅ N ₂ NaO ₇ S ₂
Molekularna masa	576.63
Analiza	Sadržaj najmanje 80% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so E ^{1%} _{1cm} 1 720 na oko 632 nm u vodenom rastvoru
Opis	Tamno plavi ili tamno zeleni prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 632 nm
B. Plavi ili zeleni rastvor u vodi	
Čistoća	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 1.0%
Organska jedinjenja osim materije boje:	
4,4'-bis(dimetilamino)-benzhidril alkohol	Najviše do 0.1%
4,4'-bis(dimetilamino)-benzofenon	Najviše do 0.1%
3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonska kiselina	Najviše do 0.2%
Leuko baza	Najviše do 5.0%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 150a OBICA KARAMELA	
Definicija	Obična karamela se priprema kontrolisanom termičkom obradom ugljikohidrata (komercijalno raspoloživi nutritivni zaslađivači za ishranu koji su monomeri glukoze i fruktoze i/ili njihovi polimeri, npr. sirupi glukoze, saharoza, i/ili invertovani sirupi, i dekstroza). Da bi se pospoješila karamelizacija, mogu se koristiti kiseline, alkali i soli, uz izuzetak amonijevih spojeva i sulfita.
Einecs	232-435-9
Opis	Tamno smeđe do crne tečnosti ili čvrste materije

Čistoća	
Boja vezana DEAE celulozom	Najviše do 50%
Boja vezana fosforil celulozom	Najviše do 50%
Intenzivnost boje ⁽¹⁾	0.01—0.12
Ukupno nitrogena	Najviše do 0.1%
Ukupno sumpora	Najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 1 mg/kg
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 25 mg/kg

⁽¹⁾ Intenzitet boje je definisan kao absorpcija 0.1% (w/v) rastvora čvrstih materija karamel boje u vodi u čeliji od 1cm na 610 nm.

E 150b KAUSTIČNO SULFITNA KARAMELA	
Definicija	Kaustična sulfitna karamela se priprema kontrolisanim termičkom obradom ugljikohidrata (komercijalno raspoloživi nutritivni zasladičivači za ishranu koji su monomeri glukoze i fruktoze i/ili njihovi polimeri, tj. sirupi glukoze, saharoza, i/ili invertovani sirupi, dekstroza) sa ili bez kiselina ili alkala, u prisustvu jedinjenja sulfita (sulfitna kiselina, kalij sulfit, kalij bisulfit, natrij sulfit i natrij bisulfit); ne upotrebljavaju se amonijeva jedinjenja.
Einecs	232-435-9
Opis	Tamno smeđe do crne tečnosti ili čvrste materije
Čistoća	
Boja vezana DEAE celulozom	Više od 50%
Intenzivnost boje ⁽¹⁾	0.05—0.13
Ukupno nitrogena	Najviše do 0.3% ⁽²⁾
Sumpor dioksid	Najviše do 0.2% ⁽²⁾
Ukupno sumpora	0.3—3.5% ⁽²⁾
Sumpor vezan DEAE celulozom	Više od 40%
Apsorpcijski odnos boje vezane DEAE celulozom	19—34
Apsorpcijski odnos ($A_{280/560}$)	Veći od 50
Arsen	Najviše do 1 mg/kg
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 25 mg/kg

⁽¹⁾ Intenzitet boje je definisan kao absorpcija 0.1% (w/v) rastvora čvrstih materija karamel boje u vodi u čeliji od 1cm na 610 nm.

⁽²⁾ Izraženo na bazi ekvivalentne boje tj. izraženo kao proizvod intenziteta boje od 0.1 jedinice apsorpcije.

E 150c AMONIJAČNA KARAMELA	

Definicija	Amonijačna karamela se priprema kontrolisanom termičkom obradom ugljikohidrata (komercijalno raspoloživi nutritivni zasladića za ishranu koji su monomeri glukoze i fruktoze i/ili njihovi polimeri, tj. sirupi glukoze, saharoza, i/ili invertovani sirupi, dekstroza) sa ili bez kiselina ili alkala, u prisustvu jedinjenja amonijaka (amonij hidroksid, amonij karbonat, amonij hidrogen karbonat i amonij fosfat); ne upotrebljavaju se sulfitna jedinjenja.
Einecs	232-435-9
Opis	Tamno smeđe do crne tečnosti ili čvrste materije
Čistoća	
Boja vezana DEAE celulozom	Najviše do 50%
Boja vezana fosforil celulozom	Više od 50%
Intenzivnost boje ⁽¹⁾	0.08—0.36
Amonijačni nitrogen	Najviše do 0.3% ⁽²⁾
4-metilimidazol	Najviše do 250 mg/kg ⁽²⁾
2-acetil-4-tetrahidroksi-butilimidazol	Najviše do 10 mg/kg ⁽²⁾
Ukupno sumpora	Najviše do 0.2% ⁽²⁾
Ukupno nitrogena	0.7—3.3% ⁽²⁾
Apsorpcijski odnos boje vezane fosforil celulozom	13—35
Arsen	Najviše do 1 mg/kg
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 25 mg/kg

⁽¹⁾ Intenzitet boje je definisan kao absorpcija 0.1% (w/v) rastvora čvrstih materija karamel boje u vodi u ćeliji od 1cm na 610 nm.

⁽²⁾ Izraženo na bazi ekvivalentne boje tj. izraženo kao proizvod intenziteta boje od 0.1 jedinice apsorpcije.

E 150d AMONIJAČNA SULFITNA KARAMELA	
Definicija	Amonijačna sulfitna karamela se priprema kontrolisanom termičkom obradom ugljikohidrata (komercijalno raspoloživi nutritivni zasladića za ishranu koji su monomeri glukoze i fruktoze i/ili njihovi polimeri, tj. sirupi glukoze, saharoza, i/ili invertovani sirupi, dekstroza) sa ili bez kiselina ili alkala, u prisustvu jedinjenja amonijaka i sulfita (sulfitna kiselina, kalij sulfit, kalij bisulfit, natrij sulfit, natrij bisulfit, amonij hidroksid, amonij karbonat, amonij hidrogen karbonat, amonij fosfat, amonij sulfat, amonij sulfit i amonij hidrogen sulfit).
Einecs	232-435-9
Opis	Tamno smeđe do crne tečnosti ili čvrste materije
Čistoća	
Boja vezana DEAE celulozom	Više od 50%
Intenzivnost boje ⁽¹⁾	0.10—0.60
Amonijačni nitrogen	Najviše do 0.6% ⁽²⁾
Sumpor dioksid	Najviše do 0.2% ⁽²⁾
4-metilimidazol	Najviše do 250 mg/kg ⁽²⁾
Ukupno nitrogena	0.3—1.7% ⁽²⁾
Ukupno sumpora	0.8—2.5% ⁽²⁾

Odnos nitrogen/sumpor alkoholnog taloga	0.7—2.7
Apsorpcijski odnos alkoholnog taloga ⁽³⁾	8—14
Apsorpcijski odnos ($A_{280/560}$)	Najviše do 50
Arsen	Najviše do 1 mg/kg
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 25 mg/kg

⁽¹⁾ Intenzitet boje je definisan kao apsorpcija 0.1% (w/v) rastvora čvrstih materija karamel boje u vodi u ćeliji od 1cm na 610 nm.

⁽²⁾ Izraženo na bazi ekvivalentne boje tj. izraženo kao proizvod intenziteta boje od 0.1 jedinice apsorpcije.

⁽³⁾ Apsorpcijski odnos alkoholnog taloga je definisan kao absorpcija taloga na 280 nm podijeljeno sa apsorpcijom na 560 nm (ćelija od 1 cm).

E 151 BRILIJANT CRNA BN, CRNA PN	
Sinonimi	CI Crna 1 za hranu
Definicija	Brilijant crna BN sastoji se u osnovi od tetraniatrij-4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naphthilazo] naftalen-1,7-disulfonata i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovni neobojeni sastojci. Brilijant crna BN se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Bisazo
Br. u Indeksu boja	28440
Einecs	219-746-5
Hemijiski naziv	Tetranatrij 4-acetamido-5-hidroksi-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilazo)-1-naphthilazo] naftalen-1,7-disulfonat
Hemijiska formula	$C_{28}H_{17}N_5Na_4O_{14}S_4$
Molekularna masa	867.69
Analiza	Sadržaj najmanje 80% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so $E_{1cm}^{1\%}$ 530 na oko 570 nm u rastvoru
Opis	Crni prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi na oko 570 nm
B. Crno-plavičasti rastvor u vodi	
Čistota	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 10% (izraženo na osnovu sastava farbe)
Organška jedinjenja osim materije boje: 4-acetamido-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kiselina 4-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disulfonska kiselina 8-aminonaftalen-2-sulfonska kiselina 4,4'-diamoaminodi-(benzensulfonska kiselina)	Ukupno najviše do 0.8%

Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% pri neutralnim uslovima
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 153 BILJNI UGALJ	
Sinonimi	Biljni ugalj
Definicija	Biljni ugalj se proizvodi karbonizacijom biljnog materijala kao što je drvo, rezidue celuloze, treset i kokos i druge ljuske. Sirovi materijal se karbonizira pri visokim temperaturama. Sastoji se u osnovi od fino razabranog uglja. Može sadržavati neznatne količine nitrogena, hidrogena i oksigena. Nešto vlage se može apsorbovati na proizvod nakon proizvodnje.
Br. u Indeksu boja	77266
Einecs	215-609-9
Hemski naziv	Ugalj
Hemski formula	C
Molekularna masa	12.01
Analiza	Sadržaj najmanje 95% uglja izračunato na anhidriranoj bazi bez pepela
Opis	Crni prah, bez okusa i bez mirisa
Identifikacija	
A. Rastvorljivost	Nerastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima
B. Sagorijevanje	Kod zagrijavanja do usijanja gori polagano bez plamena
Čistoća	
Pepeo (Ukupno)	Najviše do 4.0% (temperatura paljenja: 625 °C)
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
Poliaromatski uglijkovodici	Ekstrakt koji se dobije ekstrakcijom 1 g produkta sa 10 g čistog cikloheksana u zatvorenoj opremi za ekstrakciju je bezbojan, i fluorescencija ekstrakta na ultravioletnoj svjetlosti ne smije biti intenzivnija od iste za rastvor 0.100 mg kinin sulfata u 1 000 ml 0.01 M sumporne kiseline.
Gubitak pri sušenju	Najviše do 12% (120 °C, 4 h)
Materija rastvorljiva u alkalima	Filtrat dobiven kuhanjem 2 g uzorka sa 20 ml N natrij hidroksida i filtriranjem je bezbojan
E 154 SMEĐA FK	
Sinonimi	CI Smeđa 1 za hranu

Definicija	Smeđa FK sastoji se u osnovi od mješavine: I natrij 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonata II natrij 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzensulfonata III dinatrij 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata) IV dinatrij 4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat) V dinatrij 4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata) VI trinatrij 4,4',4''-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzensulfonata) i subsidiarne materije boje zajedno sa vodom, natrij hloridom i/ili natrij sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Smeđa FK se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Azo (mješavina mono-, bis- i trisazo boja)
Einecs	
Hemski naziv	Mješavina: I natrij 4-(2,4-diaminofenilazo) benzensulfonata II natrij 4-(4,6-diamino-m-tolilazo) benzensulfonata III dinatrij 4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata) IV dinatrij 4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonat) V dinatrij 4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenbisazo)di(benzensulfonata) VI trinatrij 4,4',4''-(2,4-diaminobenzen-1,3,5-trisazo)tri-(benzensulfonata)
Hemjska formula	I C ₁₂ H ₁₁ N ₄ NaO ₃ S II C ₁₃ H ₁₃ N ₄ NaO ₃ S III C ₁₈ H ₁₄ N ₆ Na ₂ O ₆ S ₂ IV C ₁₈ H ₁₄ N ₆ Na ₂ O ₆ S ₂ V C ₁₉ H ₁₆ N ₆ Na ₂ O ₆ S ₂ VI C ₂₄ H ₁₇ N ₈ Na ₃ O ₉ S ₃
Molekularna masa	I 314.30 II 328.33 III 520.46 IV 520.46 V 534.47 VI 726.59
Analiza	Sadržaj najmanje 70% ukupne materije boje Udjeli sastojaka od ukupne prisutne materije boje ne smiju prelaziti: I 26 % II 17 % III 17 % IV 16 % V 20 % VI 16 %
Opis	Crveno-smeđi prah ili granule
Identifikacija	
Narandžasti do crvenkasti rastvor	
Čistota	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 3.5%

Organска jedinjenja osim materije boje:	
4-aminobenzen-1-sulfonska kiselina	Najviše do 0.7%
m-fenilendiamin i 4-metil-m-fenilendiamin	Najviše do 0.35%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini izuzev m-fenilen diamina i 4-metil-m-fenilen diamina	Najviše do 0.007% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Iz rastvora sa pH 7, najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 155 SMEĐA HT	
Sinonimi	CI Smeda 3 za hranu
Definicija	Smeda HT sastoji se u osnovi od dinatrij 4,4'-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo) di (naftalen-1-sulfonata) i subsidiarne materije boje zajedno sa natrij hloridom i/ili sulfatom kao osnovnim neobojenim sastojcima. Brown HT se opisuje kao natrijeva so. Kalcijeve i kalijeve soli su također dozvoljene.
Klasa	Bisazo
Br. u Indeksu boja	20285
Einecs	224-924-0
Hemski naziv	Dinatrij 4,4'-(2,4-dihidroksi-5-hidroksimetil-1,3-fenilen bisazo)di (naftalen-1-sulfonat)
Hemski formula	C ₂₇ H ₁₈ N ₄ Na ₂ O ₉ S ₂
Molekularna masa	652.57
Analiza	Sadržaj najmanje 70% ukupne materije boje izračunato kao natrijeva so. E ^{1%} _{1cm} 403 na oko 460 nm u vodenom rastvoru pri pH 7
Opis	Crveno-smeđi prah ili granule
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u vodi pri pH 7 na oko 460 nm
B. Smeđi rastvor u vodi	
Čistota	
Materija nerastvorljiva u vodi	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Najviše do 10% (TLC metoda)
Organiska jedinjenja osim materije boje:	
4-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina	Najviše do 0.7%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izračunato kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Najviše do 0.2% u rastvoru sa pH 7
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg

Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 160 a (i) MIJEŠANI KAROTENI	
1. Biljni karoteni	
Sinonimi	CI Narandžasta 5 za hranu
Definicija	Miješani karoteni se dobivaju ekstrakcijom sa rastvaračem prirodnih loza jestivih biljaka, mrkve, biljnog ulja, trave, alfalfe (lucerke) i koprive. Osnovna materija boje se sastoji od karotenoida od kojih beta-karoten ima najveći udio. Alfa, gama-karoten i drugi pigmenti mogu biti prisutni. Pored pigmenata boja, ova supstanca može sadržavati ulja, masnoće i voskove koji se prirodno javljaju u izvornom materijalu. Samо se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: acetон, metil etil keton, dihlorometan, ugljen dioksid, metanol, etanol, propan-2-ol, heksan ⁽¹⁾ , dihlorometan i ugljen dioksid.
Klasa	Karotenoid
Br. u Indeksu boja	75130
Einecs	230-636-6
Hemiska formula	Beta-karoten: C ₄₀ H ₅₆
Molekularna masa	Beta-karoten: 536.88
Analiza	Sadržaj karotena (izračunato kao beta-karoten) je najmanje 5%. Za proekte dobivene ekstrakcijom iz biljnog ulja: najmanje 0.2% u jestivim masnoćama $E^{1\%}_{1cm}$ 2 500 na približno 440 nm do 457 nm u cikloheksanu

⁽¹⁾ Benzen najviše do 0.05% v/v.

Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na 440 nm do 457 nm i 470 nm do 486nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji: Aceton Metil etil keton Metanol Propan-2-ol Heksan Etanol Dihlorometan najviše do 10 mg/kg
Oovo	Najviše do 5 mg/kg
2. Karoteni iz algi	
Sinonimi	CI Narandžasta 5 za hranu
Definicija	Miješani karoteni mogu također biti proizvedeni iz prirodnih loza algi <i>Dunaliella salina</i> , koje rastu u velikim slanim jezerima lociranim u Whyalla, Južna Australija. Beta-karoten se ekstrahuje pomoću esencijalnih ulja. Priprava je 20 do 30%-tra suspenzija u jestivom ulju. Odnos trans-cis izomera je u intervalu od 50/50 do 71/29. Osnovna materija boje sastoji se od karotenoida od kojih beta-karoten predstavlja osnovni dio. Alfakaroten, lutein, zeaksantin i beta-kriptoksantin mogu biti prisutni. Pored pigmenata, ova substanci može sadržavati ulja, masnoće i vosak koji se prirodno javljaju u izvornom materijalu.
Klasa	Karotenoid
Br. u Indeksu boja	75130
Hemiska formula	Beta-karoten: C ₄₀ H ₅₆

Molekularna masa	Beta-karoten: 536.88
Analiza	Sadržaj karotena (izračunato kao beta-karoten) je najmanje 20%. $E^{1\%}_{1cm}$ 2 500 na približno 440 nm do 457 nm u cikloheksanu
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na 440 nm do 457 nm i 474 nm do 486nm
Čistoća	
Prirodni tokoferoli u jestivom ulju	Najviše do 0.3%
Oovo	Najviše do 5 mg/kg
E 160 a (ii) BETA-KAROTEN	
1. Beta-karoten	
Sinonimi	CI Narandžasta 5 za hranu
Definicija	Ove specifikacije važe uglavnom za sve trans izomere beta-karotena zajedno sa manjim količinama drugih karotenoida. Razblažene i stabilizirane priprave mogu imati drugačiji odnos trans-cis izomera.
Klasa	Karotenoid
Br. u Indeksu boja	40800
Einecs	230-636-6
Hemski naziv	Beta-karoten, beta,beta-karoten
Hemski formula	C ₄₀ H ₅₆
Molekularna masa	536.88
Analiza	Najmanje 96% ukupne materije boje (izraženo kao beta-karoten) $E^{1\%}_{1cm}$ 2 500 na približno 440 nm do 457 nm u cikloheksanu
Opis	Crveni do smeđe-crveni kristali ili kristalni prah
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na 453 do 456 nm
Čistoća	
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Karotenoidi osim beta-karotena: Najviše do 3.0% od ukupne materije boje
Oovo	Najviše do 2 mg/kg
2. Beta-karoten iz <i>Blakeslea trispora</i>	
Sinonimi	CI Narandžasta 5 za hranu
Definicija	Dobiven procesom fermentacije sa miješanom kulturom dvije vrste za seksualno parenje (+) i (-) i prirodnih loza glijivice <i>Blakeslea trispora</i> . Beta-karoten se ekstrahuje iz biomase sa etil acetatom, ili isobutil acetatom a zatim isopropil alkoholom, pa se kristalizira. Kristalizirani produkt se u osnovi sastoji od trans beta-karotena. Zbog prirodnog procesa, približno 3% produkta se sastoji od mješanih karotenoida, što je specifično za ovaj produkt.
Klasa	Karotenoid
Br. u Indeksu boja	40800
Einecs	230-636-6
Hemski naziv	Beta-karoten, beta,beta-karoten
Hemski formula	C ₄₀ H ₅₆
Molekularna masa	536.88

Analiza	Najmanje 96% ukupne materije boje (izraženo kao beta-karoten) $E_{1\text{cm}}^{1\%} 2\,500$ na približno 440 nm do 457 nm u cikloheksanu
Opis	Crveni, smeđe-crveni ili ljubičasti kristali ili kristalni prah (boja varira na osnovu upotrebljenog ekstrakcijskog rastvarača i uslova kristalizacije)
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na 453 nm do 456 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Etil acetat, Etanol: Najviše do 0.8%, pojedinačno ili u kombinaciji Isobutil acetat: Najviše do 1.0% Isopropil alkohol: Najviše do 0.1%
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.2%
Subsidiarne materije boje	Karotenoidi osim beta-karotena: Najviše do 3.0% od ukupne materije boje
Olovo	Najviše do 2 mg/kg
<i>Mikotoksini:</i>	
Aflatoksin B1	Nema
Trihotecen (T2)	Nema
Okratoksin	Nema
Zearalenon	Nema
Mikrobiologija:	
Plijesni	Najviše do 100/g
Kvasci	Najviše do 100/g
Salmonella	Nema u 25 g
Escherichia coli	Nema u 5 g
E 160b ANATO, BIKSIN, NORBIXIN	
Sinonimi	CI Prirodna narandžasta 4
Definicija	
Klasa	Karotenoid
Br. u Indeksu boja	75120
Einecs	Anato: 215-735-4, anato ekstrakt sjemena: 289-561-2; biksins: 230-248-7
Hemski naziv	Biksins: 6'-Metilhidrogen-9'-cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioat 6'-Metilhidrogen-9'-trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioat Norbiksins: 9'Cis-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioinska kiselina 9'-Trans-6,6'-diapokaroten-6,6'-dioinska kiselina
Hemski formula	Biksins: $C_{25}H_{30}O_4$ Norbiksins: $C_{24}H_{28}O_4$
Molekularna masa	Biksins: 394.51 Norbiksins: 380.48
Opis	Crveno-smeđi prah, suspenzija ili rastvor
Identifikacija	
Spektrometrija	Biksins: Maksimum u hloroformuna oko 502 nm Norbiksins: Maksimum u razblaženom rastvoru KOH na oko 482 nm
i) Rastvaračem ekstrahovani biksins i norbiksins	

Definicija	Biksins se dobiva ekstrakcijom vanjskog sloja sjemena anato drveta (<i>Bixa orellana L.</i>) sa jednim ili više sljedećih rastvarača: aceton, metanol, heksan ili dihlorometan, ugljen dioksid a zatim uklanjanjem rastvarača Norbiksins se dobiva hidrolizom vodenim alkalom ekstrahovanog biksina. Biksins i norbiksins mogu sadržavati druge materijale ekstrahovane iz anato sjemena. Biksins prah sadrži nekoliko obojenih sastojaka, od kojih je glavna biksins, koji može biti prisutan i u cis- i u trans- oblicima. Proizvodi termičke razgradnje biksina također mogu biti prisutni. Norbiksins prah sadrži proizvode hidrolize biksina, u obliku natrij ili kalij soli kao osnovnih materija boje. Mogu biti prisutni i cis- i trans-oblici.
Analiza	Sadržaj biksins praha: najmanje 75% ukupnih karotenoida izračunato kao biksins. Sadržaj norbiksins praha: najmanje 25% ukupnih karotenoida izračunato kao norbiksins Biksins: $E^{1\%}_{1cm}$ 2 870 na oko 502 nm u hloroformu Norbiksins: $E^{1\%}_{1cm}$ 2 870 na oko 482 nm u rastvoru KOH
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Aceton, Metanol, Heksan: Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
(ii) <i>Alkalom ekstrahovan anato</i>	
Definicija	Anato koji je rastvorljiv u vodi se dobiva ekstrakcijom sa vodenim alkalom (natrij ili kalij hidroksid) vanjskih slojeva sjemena anato drveta (<i>Bixa orellana L.</i>) Anato koji je rastvorljiv u vodi sadrža norbiksins, proizvod hidrolize biksina, u obliku natrijeve ili kalijeve soli, kao osnovna materija boje. Mogu biti prisutni i cis- i trans-oblici.
Analiza	Sadrži najmanje 0.1% ukupnih karotenoida izraženo kao norbiksins Norbiksins: $E^{1\%}_{1cm}$ 2 870 na oko 482 nm u rastvoru KOH
Čistoća	
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
(iii) <i>Uljem ekstrahovan anato</i>	
Definicija	Anato ekstrakti u ulju, kao rastvor ili suspenzija, dobivaju se ekstrakcijom vanjskih slojeva sjemena anato drveta (<i>Bixa orellana L.</i>) sa jestivim biljnim uljem. Anato ekstrakt u ulju sadrži nekoliko komponenata boje, od koje je osnovna biksins, koja može biti prisutna i u cis- i u trans-oblicima. Proizvodi termičke razgradnje biksina također mogu biti prisutni.
Analiza	Sadrži najmanje 0.1% od ukupnih karotenoida izraženo kao biksins Biksins: $E^{1\%}_{1cm}$ 2 870 na oko 502 nm u hloroformu
Čistoća	
Arsen	Najviše do 3 mg/kg

Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 160c EKSTRAKT PAPRIKE, KAPSANTIN, KAPSORUBIN	
Sinonimi	Paprika Oleosmola
Definicija	Ekstrakt paprike se dobiva ekstrakcijom rastvaračem iz prirodnih loza paprike, koji se sastoje od mljevenih čahura ploda, sa ili bez sjemena, od <i>Capsicum annuum L.</i> , i sadrži osnovne materije boje ovog začina. Osnovne materije boje su kapsantin i kapsorubin. Poznato je da su također prisutne i razne vrste drugih obojenih jedinjenja. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: metanol, etanol, aceton, heksan, dihlorometan, etil acetat i ugljen dioksid.
Klasa	Karotenoíd
Einecs	Kapsantin: 207-364-1, Kapsorubin: 207-425-2
Hemski naziv	Kapsantin: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihidroksi-β,k-karoten-6-on Kapsorubin: (3S, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihidroksi-k,k-karoten-6,6'-dion
Hemjska formula	Kapsantin: C ₄₀ H ₅₆ O ₃ Kapsorubin: C ₄₀ H ₅₆ O ₄
Molekularna masa	Kapsantin: 584.85 Kapsorubin: 600.85
Analiza	Ekstrakt paprike: Sadržaj najmanje 7.0% karotinoida Kapsantin / Kapsorubin: Najmanje 30% ukupnih karotenoïda $E^{\text{1\%}}_{1\text{cm}}$ 2 100 na oko 462 nm u acetonu
Opis	Tamno crvena viskozna tečnost
Identifikacija	
A. Spektrometrija	Maksimum u acetonu na oko 462 nm
B. Obojena reakcija	Nastaje tamno plava boja dodatkom jedne kapi sumporne kiseline u jednu kap uzorka, koji je u 2–3 kapi hloroformu
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Etil acetat, Metanol, Etanol, Aceton, Heksan: Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Kapsaicin	Najviše do 250 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 160d LIKOPEN	
Sinonimi	Prirodna žuta 27
Definicija	Likopen se dobiva ekstrakcijom rastvaračem iz prirodnih loza crvenog paradaja (<i>Lycopersicon esculentum L.</i>) uz naknadno odstranjivanje rastvarača. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti: dihlorometan, ugljen dioksid, etil acetat, aceton, propan-2-ol, metanol, etanol, heksan. Osnovna materija boje paradaja je likopen, a mogu biti prisutni i drugi karotenoïdi pigmenti u minornim količinama. Pored drugih pigmenta boje produkt može sadržavati ulja, masnoće, vosak, i arome koji se prirodno nalaze u paradaju.

Klasa	Karotenoïd
Br. u Indeksu boja	75125
Hemijiski naziv	Likopen, Likopen, β , γ -karoten
Hemijiska formula	C ₄₀ H ₅₆
Molekularna masa	536.85
Analiza	E ^{1%} _{1cm} 3 450 na oko 472 nm u heksanu E ^{1%} _{1cm} 3 450 na oko 472 nm u heksanu
Opis	Tamno crvena viskozna tečnost
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u heksanu na oko 472 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Etil acetat, Metanol, Etanol, Aceton, Heksan, Propan-2-ol: Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.1%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 160e BETA-APO-8'-KAROTENAL (C30)	
Sinonimi	CI Narandžasta 6 za hranu
Definicija	Ove specifikacije se odnose na predominantno isključivi <i>trans</i> izomer β -apo-8'-karotenala zajedno sa neznatnim količinama drugih karotenoida. Razblaženi i stabilizirani oblici se dobivaju iz β -apo-8'-karotenala koji je u skladu sa ovim specifikacijama i uključuje rastvore ili suspenzije β -apo-8'-karotenala u jestivim masnoćama ili uljima, emulzije i prašak dispergovani u vodi. Te priprave mogu imati različite odnose cis/trans izomera.
Klasa	Karotinoid
Br. u Indeksu boja	40820
Einecs	214-171-6
Hemijiski naziv	β -apo-8'-karotenal, Trans- β -apo-8'karoten-aldehid
Hemijiska formula	C ₃₀ H ₄₀ O
Molekularna masa	416.65
Analiza	Najmanje 96% of ukupne materije boje E ^{1%} _{1cm} 2 640 at 460—462 nm u cikloheksanu
Opis	Tamno ljubičasti kristali sa metalnim sjajem ili kristalni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na 460—462 nm
Čistoća	
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.1%
Subsidiarne materije boje	Karotenoidi pored β -apo-8'-karotenala: Najviše do 3.0% of ukupne materije boje
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg

Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 10 mg/kg
E 160f ETIL ESTER BETA-APO-8'-KAROTENSKE KISELINE (C30)	
Sinonimi	CI Narandžasta 7 za hranu, β -apo-8'-karotenski ester
Definicija	Ove specifikacije se odnose na predominantno isključivi trans izomer β -apo-8'-karotensko kiselinskog etil estera zajedno sa neznatnim količinama drugih karotenoida. Razblaženi i stabilizirani oblici se dobivaju iz β -apo-8'-karotensko kiselinskog etil estera koji je u skladu sa ovim specifikacijama i uključuje rastvora ili suspenzije β -apo-8'-karotensko kiselinskog etil estera u jestivim masnoćama ili uljima, emulzije i prašak dispergovan u vodi. Te priprave mogu imati različite odnose cis/trans izomera.
Klasa	Karotinoid
Br. u Indeksu boja	40825
Einecs	214-173-7
Hemski naziv	β -Apo-8'-karotensko kiselinski etil ester, etil 8'-apo- β -karoten-8'-oat
Hemski formula	C ₃₂ H ₄₄ O ₂
Molekularna masa	460.70
Analiza	Najmanje 96% ukupne materije boje E ^{1%} _{1cm} 2 550 na oko 449 nm u cikloheksanu
Opis	Crveni do ljubičasto-crveni kristali ili kristalni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u cikloheksanu na oko 449 nm
Čistoća	
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.1%
Subsidiarne materije boje	Karotenoidi osim β -apo-8'-karotensko kiselinskog etil estera: Najviše do 3.0% ukupne materije boje
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 10 mg/kg
E 161b LUTEIN	
Sinonimi	Mješani karotenoidi, Ksantofili
Definicija	Lutein se dobiva ekstrakcijom rastvaračem iz prirodnih loza jestivih plodova i biljaka, trave, luterke (alfalfa) i <i>Tagetes erecta</i> . Osnovna materija boje se sastoji od karotenoida gdje su lutein i esteri njegovih masnih kiselina zastupljeni u najvećoj količini. Različite količine karotena također su prisutne. Lutein može sadržavati masnoće, ulja i voskove koji se prirodno nalaze u biljnog materijalu. Samo se sljedeći rastvarači mogu upotrijebiti za ekstrakciju: metanol, etanol, propan-2-ol, heksan, acetон, metil etil keton, dihlorometan i ugljen dioksid.
Klasa	Karotenoid
Einecs	204-840-0
Hemski naziv	3,3'-dihidroksi-d-karoten
Hemski formula	C ₄₀ H ₅₆ O ₂
Molekularna masa	568.88

Analiza	Sadržaj ukupne materije boje: Najmanje 4% izračunato kao lutein $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 2 550 na oko 445 nm u hloroformu/etanolu (10 + 90) ili u heksanu/etanolu/facetonu (80 + 10 + 10)
Opis	Tamna, žuto-smeđa tečnost
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u hloroformu/etanolu (10 + 90) na oko 445 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Aceton, Metil etil keton, Metanol, Etanol, Propan-2-ol, Heksan; Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji Dihlorometan: Najviše do 10 mg/kg
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 161g KANTAKSANTIN	
Sinonimi	CI Narandžasta 8 za hranu
Definicija	Ove specifikacije se odnose na predominantno isključivi trans izomer kantaksantina zajedno sa neznatnim količinama drugih karotenoïda. Razblaženi i stabilizirani oblici se dobivaju iz kantaksantina koji je u skladu sa ovim specifikacijama i uključuje rastvora ili suspenzije kantaksantina u jestivim masnoćama ili uljima, emulzije i prašak dispergovani u vodi. Te priprave mogu imati različite odnose cis/trans izomera..
Klasa	Karotinoid
Br. u Indeksu boja	40850
Einecs	208-187-2
Hemski naziv	β -karoten-4,4'-dion, kantaksantin, 4,4'-diokso- β -karoten
Hemjska formula	C ₄₀ H ₅₂ O ₂
Molekularna masa	564.86
Analiza	Najmanje 96% ukupne materije boje (izraženo kao kantaksantin) $E_{1\text{cm}}^{1\%}$ 2 200 na oko 485 nm u hloroformu na 468—472 nm u cikloheksanu na 464—467 nm u petrolejskom eteru
Opis	Tamno ljubičasti kristali ili kristalni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u hloroformu na oko 485 nm Maksimum u cikloheksanu na 468—472 nm Maksimum u petrolejskom eteru na 464—467 nm
Čistoća	
Sulfatni pepeo	Najviše do 0.1%
Subsidiarne materije boje	Karotenoidi osim kantaksantina: Najviše do 5.0% ukupne materije boje
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 162 CVEKLA CRVENA, BETANIN	

Sinonimi	Cvekla crvena
Definicija	<p>Cvekla crvena se dobiva iz korijena prirodnih loza cvekle (<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>rubra</i>) cijednjem smrđljene cvekle kao iscijedeni sok ili vodenom ekstrakcijom rendane cvekle a zatim obogaćivanjem aktivne osnovne materije. Boja se sastoji od različitih pigmenata od kojih svi spadaju u betalain klasu. Osnovna materija boje se sastoji od betacianina (crveni) gdje na betanin odlazi 75—95%. Neznatne količine betaksantina (žuti) i proizvodi razgradnje betalaína (svjetlo smeđi) mogu biti prisutni.</p> <p>Pored pigmenata boje sok ili ekstrakt se sastoji od šećera, soli, i/ili proteina koji se prirodno nalaze u cvekli. Rastvor može biti koncentrovan i neki proizvodi mogu biti rafinirani da bi se odstranila većina šećera, soli i proteina.</p>
Klasa	Betalain
Einecs	231-628-5
Hemijski naziv	(S-(R', R')-4-(2-(2-Karboksi-5(β -D-glukopiranosiloksi)-2,3-dihidro-6-hidroksi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboksilna kiselina; 1-(2,(6-dikarboksi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridiliden) etiliden)-5- β -D-glukopiranosiloksi)-6-hidroksiindolum-2-karboksilat
Hemijiska formula	Betanin: C ₂₄ H ₂₆ N ₂ O ₁₃
Molekularna masa	550.48
Analiza	Sadržaj crvene boje (izraženo kao betanin) je najmanje 0.4% E _{1cm} ¹ 120 na oko 535 nm u vodenom rastvoru pri pH 5
Opis	Crvena ili tamno crvena tečnost, kaša, prah ili čvrsta materija
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u vodi pri pH 5 na oko 535 nm
Čistota	
Nitrat	Najviše do 2 g nitrat aniona/g crvene boje (izračunate iz Analize).
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 163 ANTOCIJANINI	
Definicija	<p>Antocijanini se dobivaju ekstrakcijom sa sulfitnom vodom, zakiseljenom vodom, ugljen dioksidom, metanolom ili etanolom iz prirodnih loza povrća i jestivih plodova. Antocijanini sadrže uobičajene komponente izvornog materijala, tj antocianin, organske kiseline, tanine, šećere, minerale itd, ali oni ne moraju biti u istom odnosu kao što je to u izvornom materijalu.</p>
Klasa	Antocijanin
Einecs	208-438-6 (cianidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)
Hemijski naziv	<p>3,3',4',5,7-Pentahidroksi-flavilium hlorid (cianidin) 3,4',5,7-Tetrahidroksi-3'-metoksiflavilium hlorid (peonidin) 3,4',5,7-Tetrahidroksi-3',5'-dimetoksiflavilium hlorid (malvidin) 3,5,7-Trihidroksi-2-(3,4,5-trihidroksifenil)-1-benzopirilium hlorid (delfinidin) 3,3',4',5,7-Pentahidroksi-5'-metoksiflavilium hlorid (petunidin) 3,5,7-Trihidroksi-2-(4-hidroksifenil)-1-benzopirilium hlorid (pelargonidin)</p>

Hemijска formula	Cianidin: C ₁₅ H ₁₁ O ₆ Cl Peonidin: C ₁₆ H ₁₃ O ₆ Cl Malvidin: C ₁₇ H ₁₅ O ₇ Cl Delfnidin: C ₁₅ H ₁₁ O ₇ Cl Petunidin: C ₁₆ H ₁₃ O ₇ Cl Pelargonidin: C ₁₅ H ₁₁ O ₅ Cl
Molekularna masa	Cianidin: 322.6 Peonidin: 336.7 Malvidin: 366.7 Delfnidin: 340.6 Petunidin: 352.7 Pelargonidin: 306.7
Analiza	E ^{1%} _{1cm} 300 za čisti pigment na 515-535 nm pri pH 3.0
Opis	Ljubičasto-crvena tečnost, prah ili kaša, blagog karakterističnog mirisa
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u metanolu sa 0.01% rastvorom HCl Cianidin: 535 nm Peonidin: 532 nm Malvidin: 542 nm Delfnidin: 546 nm Petunidin: 543 nm Pelargonidin: 530 nm
Čistoća	
Rezidue rastvarača	Metanol i Etanol: Najviše do 50 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji
Sumpor dioksid	Najviše do 1 000 mg/kg po procentu pigmenta
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 170 KALCIJ KARBONAT	
Sinonimi	Cl Bijeli pigment 18, kreda
Definicija	Kalcij karbonat je proizvod koji se dobiva iz mljevenog krečnjaka ili taloženjem kalcij jona sa karbonat jonica.
Klasa	Anorganska
Br. u Indeksu boja	77220
Einecs	Kalcij karbonat: 207-439-9 Krečnjak: 215-279-6
Hemijski naziv	Kalcij karbonat
Hemijaska formula	CaCO ₃
Molekularna masa	100.1
Analiza	Sadržaj najmanje 98% na anhidriranoj bazi
Opis	Bijeli kristalni ili amorfni, bezmirisni prah, bez okusa
Identifikacija	
Restvorljivost	Gotovo nerastvorljiv u vodi i alkoholu. Rastvara se uz pjenušanje u razblaženoj acetatnoj kiselini, razblaženoj hlorovodoničnoj kiselini i razblaženoj nitratnoj kiselini, i dobiveni rastvori, nakon kuhanja, daju pozitivan test na kalcij.
Čistoća	

Gubitak pri sušenju	Najviše do 2.0% (200 °C, 4 sata)
Substance nerastvorljive u kiselini	Najviše do 0.2%
Magnezijeve i alkalne soli	Najviše do 1.5%
Flurid	Najviše do 50 mg/kg
Antimon (kao Sb)	Najviše do 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji:
Bakar (kao Cu)	Najviše do 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji:
Hrom (kao Cr)	Najviše do 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji:
Cink (kao Zn)	Najviše do 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji:
Barij (kao Ba)	Najviše do 100 mg/kg, pojedinačno ili u kombinaciji:
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
E 171 TITANIUM DIOKSID	
Sinonimi	CI Bijeli pigment 6
Definicija	Titan dioksid sastoji se u osnovi od čiste anataze i/ili rutil titanium dioksida koji može biti obložen malim količinama alumine i/ili silike da bi se poboljšale tehnološke osobine produkta.
Klasa	Anorganska
Br. u Indeksu boja	77891
Einecs	236-675-5
Hemski naziv	Titan dioksid
Hemski formula	TiO ₂
Molekularna masa	79.88
Analiza	Sadržaj najmanje 99% na bazi bez prisustva alumine i silike
Opis	Bijeli do neznatno obojeni prah
Identifikacija	
Rastvorljivost	Nerastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima. Sporo se rastvara u florovodoničnoj kiselini i u u vrloj koncentrovanoj sumpornoj kiselini.
Čistoća	
Gubitak pri sušenju	Najviše do 0.5% (105 °C, 3 sata)
Gubitak pri paljenju	Najviše do 1.0% na bazi bez prisustva isparljive materije (800 °C)
Alumij oksid i/ili silicij dioksid	Ukupno najviše do 2.0%
Materija rastvorljiva u 0.5N HCl	Najviše do 0.5% na bazi bez prisustva alumine i silike i dodatno, za proekte koji sadrže alumenu i/ili siliku, najviše do 1.5% na bazi produkta koji se daje na tržište.
Materija rastvorljiva u vodi	Najviše do 0.5%
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Antimon	Najviše do 50 mg/kg potpunim rastvaranjem
Arsen	Najviše do 3 mg/kg potpunim rastvaranjem
Olovo	Najviše do 10 mg/kg potpunim rastvaranjem
Živa	Najviše do 1 mg/kg potpunim rastvaranjem
Cink	Najviše do 50 mg/kg potpunim rastvaranjem
E 172 ŽELJEZO OKSIDI I ŽELJEZO HIDROOKSIDI	
Sinonimi	Željezo oksid žuti: CI Žuti pigment 42 i 43 Željezo oksid crveni: CI Crveni pigment 101 i 102 Željezo oksid crni: CI Crni pigment 11

Definicija	Željezo oksidi i željezo hidroksidi se proizvode sintetički i sastoje se u osnovi do anhidriranih i/ili hidriranih željezo oksida. Raspon boja uključuje žute, crvene, smeđe i crne. Željezo oksidi prehrambenog kvaliteta se primarno razlikuju od tehničkih vrsta na osnovu srazmjerne malih nivoa kontaminacije drugim metalima. To se postiže selekcijom i kontrolom izvora željeza i/ili stepenom hemijskog prečišćavanja u toku procesa proizvodnje.
Klasa	Anorganska
Br. u Indeksu boja	Željezo oksid žuti: 77492 Željezo oksid crveni: 77491 Željezo oksid crni: 77499
Einecs	Željezo oksid žuti: 257-098-5 Željezo oksid crveni: 215-168-2 Željezo oksid crni: 235-442-5
Hemijski naziv	Željezo oksid žuti: hidrirani željezo oksid, hidrirani željezo (III) oksid Željezo oksid crveni: anhidrirani željezo oksid, anhidrirani željezo (III) oksid Željezo oksid crni: ferošo željezo oksid, željezo (II, III) oksid
Hemijska formula	Željezo oksid žuti: $\text{FeO(OH)} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ Željezo oksid crveni: Fe_2O_3 Željezo oksid crni: $\text{FeO Fe}_2\text{O}_3$
Molekularna masa	88.85: FeO(OH) 159.70: Fe_2O_3 231.55: $\text{FeO Fe}_2\text{O}_3$
Analiza	Žuti: najmanje 60%, Crveni i crni: najmanje 68% ukupno željezo, izraženo kao željezo
Opis	Prah; žute, crvene, smeđe ili crne boje
Identifikacija	
Rastvorljivost	Nerastvorljivi u vodi i u organski rastvaračima. Rastvorljivi u koncentrovanim mineralnim kiselinama
Čistoća	
Materija rastvorljiva u vodi	Najviše do 1.0% potpunim rastvaranjem
Arsen	Najviše do 5 mg/kg potpunim rastvaranjem
Barium	Najviše do 50 mg/kg potpunim rastvaranjem
Kadmij	Najviše do 5 mg/kg potpunim rastvaranjem
Hrom	Najviše do 100 mg/kg potpunim rastvaranjem
Bakar	Najviše do 50 mg/kg potpunim rastvaranjem
Olovo	Najviše do 20 mg/kg potpunim rastvaranjem
Živa	Najviše do 1 mg/kg potpunim rastvaranjem
Nikl	Najviše do 200 mg/kg potpunim rastvaranjem
Cink	Najviše do 100 mg/kg potpunim rastvaranjem
E 173 ALUMINIJ	
Sinonimi	CI Metalni pigment, Al
Definicija	Aluminij prah se sastoji od fino odvojenih čestica aluminija. Mljevenje može i ne mora biti izvršeno u prisustvu jestivih biljnih ulja i/ili masnih kiselina kvaliteta prehrambenih aditiva. U njemu nema drugih substanci osim jestivih biljnih ulja i/ili masnih kiselina kvaliteta prehrambenih aditiva.
Br. u Indeksu boja	77000
Einecs	231-072-3

Heminski naziv	Aluminij
Hemiska formula	Al
Atomska masa	26.98
Analiza	Najmanje 99% izračunato kao Al bez prisustva masnoće
Opis	Srebreno-sivi prah ili mali listići
Identifikacija	
Rastvorljivost	Nerastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima. Rastvorljiv u razblaženoj hlorovodoničnoj kiselini. Rezultirajući rastvor daje pozitivan test na aluminij.
Čistoća	
Gubitak pri sušenju	Najviše do 0.5% (105 °C, do konstantne težine)
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg
E 174 SREBRO	
Sinonimi	Argentum, Ag
Klasa	Anorganska
Br. u Indeksu boja	77820
Einecs	231-131-3
Heminski naziv	Srebro
Hemiska formula	Ag
Atomska masa	107.87
Analiza	Sadržaj najmanje 99.5% Ag
Opis	Prah ili mali listići srebrene boje
E 175 ZLATO	
Sinonimi	Metalni pigment 3, Aurum, Au
Klasa	Anorganska
Br. u Indeksu boja	77480
Einecs	231-165-9
Heminski naziv	Zlato
Hemiska formula	Au
Atomska masa	197.0
Analiza	Sadržaj najmanje 90% Au
Opis	Prah ili mali listići zlatne boje
Čistoća	Nakon potpunog rastvaranja
Srebro	Najviše do 7%
Bakar	Najviše do 4%
E 180 LITOL RUBIN BK	
Sinonimi	CJ Crveni pigment 57, Rubinpigment, Karmin 6B
Definicija	Lithol rubin BK sastoji se u osnovi od kalcij 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalenkarboksilata i subsidiarne materije boje zajedno sa vodom, kalcij hloridom i/ili kalcij sulfatom kao osnovne neobojene materije.
Klasa	Monoazo

Br. u Indeksu boja	15850:1
Einecs	226-109-5
Hemski naziv	Kalcij 3-hidroksi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilazo)-2-naftalen-karboksilat
Hemski formula	C ₁₈ H ₁₂ CaN ₂ O ₆ S
Molekularna masa	424.45
Analiza	Sadržaj najmanje 90% ukupne materije boje E ^{1%} _{1cm} 200 na oko 442 nm u dimetilformamidu
Opis	Crveni prah
Identifikacija	
Spektrometrija	Maksimum u dimetilformamidu na oko 442 nm
Čistota	
Subsidiarne materije boje	Najviše do 0.5%
Organska jedinjenja osim materije boje:	
2-Amino-5 metilbenzen-sulfonska kiselina, kalcijeva so	Najviše do 0.2%
3-hidroksi-2-naftalen-karboksilna kiselina, kalcijeva so	Najviše do 0.4%
Nesulfonizirani primarni aromatski amini	Najviše do 0.01% (izraženo kao anilin)
Materija koja se ekstrahuje eterom	Iz rastvora sa pH 7, Najviše do 0.2%
Arsen	Najviše do 3 mg/kg
Olovo	Najviše do 10 mg/kg
Živa	Najviše do 1 mg/kg
Kadmij	Najviše do 1 mg/kg
Teški metali (kao Pb)	Najviše do 40 mg/kg